

## A kék áfonya mint pót-cser-anyag.

A jó gazda mit sem hanyagol el, mit sem becsül oly csekélyre, hogy azt figyelmére ne méltatná. Szorgos gazdákat gyakran lehet látni, mint szednek össze udvaraik táján különféle csekély értékű dolgokat, s ha kérdjük miért teszik azt, egyszerűn azt felelik: majd csak elkél valamire. —

Ezen elvet követem én, midőn az erdészeti háztartásból egy ily csekélységet ki emelvén, azt tisztelt szaktársaim figyelmébe ajánlom, dacára annak, hogy előre tudom, miszerint sokan e sorok tisztelt olvasói közül azt fogják mondani: krajczáros gazdának jó az ilyesmi, hanem nagyobb mérvű s fontosabb jövedelmi ágakkal foglalkozó erdőszt figyelmét nem érdemli; erre azonban azt válaszolom: tégy krajczárt krajczárhoz forint lesz belőle.

Azon csekélység tehát, melyre a t. erdészeti közönséget figyelmeztetni akarom, nem más, mint a magasabb vidékek fenyveseinek természetes újbólitását oly makacsul akadályozó kék-áfonya (*Vaccinium myrtillus*). Ezen növény egy éves szárai eseranyagtartalmuk miatt különösen borju bőr kikészítésre sokkal alkalmasabbak lévén minden egyéb cserző anyagnál, bizonynyára megérdemli figyelemünket, és csak attól függ, ha jövedelmi forrásul akarjuk e felhasználni, vagy sem. E forrás bizonynyára nagyobb hasznot ígér, mint az első pillanatra látszik, mert nem csak hogy eladása némi jövedelmet ígér, ha azt czélszerűen az alább leírandó egyszerű mód szerint üzleti tárgygyá tenni el nem lasztjuk, hanem felhasználása által is azon előnyben részesítjük állabainkat, hogy fiatal ültetvényeinket, melyeket elfojtással fenyeget tőle megtisztítván, zsenge ültönczeink vitorább s erőteljesebb tenyészetét idézzük elő. —

Továbbá minden erdész előtt ismeretes, mennyi akadályt gördít ezen növény buja tenyészete munkánk elé, oly — főleg éjszak, éjszaknyugati és éjszakkéleti oldalakon fekvő vágásainkban, hol az újbólitást mesterséges úton akarjuk véghez vinni, s mely területek közönségesen — főleg ha az ültetést bár mi oknál fogva néhány évre halasztottuk — a kék-áfonya majd nem áthatlan rétegével bevonvák. Ha tehát ezen növényt eltávolítjuk, nem csak hogy munkánkat könnyítjük, és ültönczeinket az elfojtás ellen biztosítjuk, hanem felhasználása által eladási czikkre is

teszünk szert, melynek ára ültetvényezési költségeinknek legalább egy részét pótolandja. —

Nyerése ezen növények egyszerű sarlózásban áll, melyet jó mélyen a moha rétegig, mely rendszerint gyökerét vídi, kell alkalmazni.

Minthogy pedig május hava az, melyben ezen munkának történnie kell, világos, hogy az áfonya cser nyelését könnyű szerrel összelehet kapcsolni az ültetési munkával, mi által termelési költségei kevesbedni fognak. —

Az áfonyaszárak lesarlózásuk után gondosan megtisztítandók minden földrészek, fadarabkák és egyéb idegen részekről, mi szinte könnyű s csekély költséget igénylő mód, ha azt némi kis munkabérért az ültetvényezési munka szüniideje alatt napszamosainkkal megtétetjük, kik örülni fognak, ha ilyféle játékmunka által hasznosan értékesíthetik idejüket.

Ezek után nincs egyéb hátra, mint hogy az így megtisztított áfonyaszárakat napon megszáritva szecskavágó segedelmével felaprózzuk, s így az eladásra száraz helyen készen tartjuk. —

Használati módja nem lenne ugyan a mi dolgunk, mindamellet meg kell itt jegyeznünk, hogy legcélszerűbb ha eső vízben főzetik, s így használtatik a borjubőr kikészítésére.

*Kabina János.*

## Légtüneti észleletek Selmeczen 1868.

### 1. Január hóban.

**Légnymomás:** átlag 313,29 pár. vonal; legnagyobb 16-án délben 318,12, legkisebb 21-én reggel 304,30.

**Légmérsék:** átlag — 1,50 fok R; legnagyobb 18-án délben + 5,2, legkisebb 1-én reggel — 9,8.

**Páryomás:** átlag 1,59 pár. vonal; legnagyobb 18-án délben 2,83 legkisebb 25-én reggel 0,71.

**Nedvesség** százalékokban: átlag 83,3 legnagyobb 23-án egész nap 100,0 — legkisebb 2-án délben 63,0. —

**Felhözet:** átlag 7,8 legnagyobb (10) 14 nap, (6—8) 9 nap, (2—5) 8 nap; — derült nap egy sem.