

wieder Zeiten der Übersättigung folgen; deshalb ist für den Wald und seine Verminderung ein rasches Tempo nicht von gutem.“ Hogy ez a „hid“ megállja-e a terhelési próbát, a legközelebbi jövő fogja mutatni.



A kámoni arboretum.

Irta: Gáyer Gyula dr.

„*Chamaecyparis nutkaensis ericoides* ist im Garten des Herrn Stephan von Sághy in Kámon (bei Szombathely, Ungarn) entstanden“, írja Beissner (Nadelholzkde, 536. o.). Mindazonáltal a kámoni park kincsei mindezideig ismeretlenek maradtak a magyar szakközönség előtt. Sőt ha el is jutott volna Kámon közszégebe magyar dendrológus, a falun áthaladva akkor sem sejthette, hogy milyen érdekes park rejtozik közvetlen közelében. Sághy István dr. kámoni földbirtkos angol kényelemmel berendezett s magyarosan vendégszerető uriháza a falu egy mellékutcájára néz s főképpen mögötte terül el a nyolc holdas park sok kertészeti ritkaságával. A park fiatalabb része 20 éves. Idősebb részeit még a jelenlegi tulajdonos édesatyja parkirozta s itt hatalmas példányai láthatók az *Abies cephalonica*, *Thuya gigantea* s más fajoknak. A pompás *Sequoia*-k is a jáslói majorban id. Sághy István emlékét hirdetik, de a parknak igazán tudományos színvonalra emelése és kifejlesztése a jelenlegi tulajdonos műve. A kámoni parkot különösen az teszi értékessé, hogy a ritkaságok többnyire jól kifejlett, szép példányokban vannak meg. A fajok és fajták számát s a ritkaságokat tekintve nem csupán a vasmegyei parkok között vezet, hanem kivált coniferák tekintetében kétségtelenül az ország leggazdagabb arboretuma. Sághy István dr. úr szives volt a kert fáinak és cserjéinek katalógusát összeállítani s ezt itt közzéadom, †-tel jelezve meg azokat a fajokat, melyek 1916-ban árviz következtében elpusztultak.

I. Tűlevelű fák.

Abies amabilis, *arizonica*, *balsamea*, *brachyphylla* (*homolepis*), *bracteata*, *cephalonica*, *ceph.* var. *Apollinis*, *ceph.* var. *Reginae Amaliae*, *cilicica*, *concolor*, *conc.* var. *violacea*, *conc.* var. *lasiocarpa*,

firma, Fraseri, grandis, magnifica, Mariesii, nobilis var. glauca, nob. var. argentea, Nordmanniana, numidica, nephrolepis, pectinata, Pindrow, Pinsapo, sachalinensis, † sibirica, subalpina, umbilicata, Veitchii, Webbiana. *Araucaria* imbricata. *Biota* orientalis cum formis: aurea, † decussata, filiformis. *Cedrus* atlantica et f. argentea, † Deodara, Libani. *Cephalotaxus* drupacea, Fortunei, pedunculata et f. fastigiata. *Chamaecyparis* Lawsoniana (cum formis: Alumi, argentea, aurea, casuarinoides, conica, erecta viridis, filiformis, Fraseri, intertexta, † monumentalis, † pendula, robusta, worlei), nutkaensis (cum forma: pendula), obtusa (cum formis: aurea, breviramea, filicoides, lycopodioides), pisifera (cum formis: filifera, plumosa, plum. aurea, plum. argentea, squarrosa), sphaeroidea (cum formis: andelyensis, ericoides, glauca). *Cryptomeria* japonica cum formis: araucarioides, dacrydiodes, elegans, lycopodioides, monstrosa, pungens, selaginoides, spiraliter falcata. † *Cunninghamia* sinensis. *Cupressus* arizonica. *Ephedra* procera. *Ginkgo* biloba. *Juniperus* chinensis (mas et fem., ceterum formae: aurea, argentea), communis (et f. hibernica), drupacea, excelsa, Ketuleeri, occidentalis, pachyphloca, pseudocupressus, recurva squamata, rigida, Sabina. (prostrata et fastigiata), sphaerica, taxifolia (oblonga pendula), thurifera, virginiana (cum formis: albospica, cinerascens, elegan-
tissima, glauca, pendula). † *Keteleeria* Fortunei. *Larix* dahurica, europaea, kurilensis, leptolepis, occidentalis, † sibirica. *Libocedrus* decurrens. *Picea* ajanensis, alba, Alcockiana, Breweriana, Engelmanni, excelsa (cum formis: argentea-spica, aurea, Basii, Cranstoni, inversa, monstrosa, phyllicoides, repens, viminalis) Glehni, hondoensis, Morinda, nigra, (formae: Donnetti et Mariana), obovata, Omorica, orientalis, polita, pungens argentea, rubra, Schrenkiana, sitchensis. *Pinus* aristata, Armandi, Ayacahuite, Banksiana, Bungeana, Cembra (et forma sibirica), contorta, Coulteri, densiflora, edulis, excelsa, flexilis, Gerardiana, † Hartwegi, inops, insignis, Jeffreyi, Koreaensis, Lambertiana, Laricio (cum subspeciebus austriaca, Pallasiana, monspeliensis), leucodermis, mitis, montana (cum subspec. mughus et uncinata), monticola, monophylla, muricata, Murrayana, Nelsoni, † osteosperma, parviflora, Parryana, pentaphylla, Peuce, Pinaster, ponderosa (et pond. scopolorum), † pumila, pungens, resinosa, rigida, Sabiniana, silvestris (cum formis: argentea compacta et

*Wateriana) strobis, Thunbergi † tuberculata. Pseudolarix Kaempferi. Pseudotsuga Douglasi (et forma glauca), macrocarpa. Sciadopitys verticillata. Sequoia gigantea. Taxodium distichum et f. pendulum. Taxus baccata (cum formis: adpressa stricta, Dovastoni pendula, fastigiata, fast. aureovariegata), canadensis, cuspidata. Thuya gigantea, occidentalis (cum formis: Bodmeri, Boothi, cristata, Douglasi pyramidalis, Ellwangeriana, ericoides, fastigiata, Hoveyi, pendula, Spaethi, Vervaeneana, Warreana), plicata, Standiski. Thuyopsis dolabrata. Torreya † californica, grandis, nucifera. Tsuga canadensis, Caroliniana, diversifolia, † Mertensiana, Pattoniana, Sieboldii, † Brunoniana. Összesen 244-féle Conifera, melyek közül akárhány ritkaságot Sághy ur összeköttetései és a meghozott anyagi áldozatok révén importálása után közvetlenül már beiktathatott kertjének fái közé. A *Taiwania cryptomeroides*-ből egyenesen Formosa szigetéről kapta a magvakat, de ezek nem csíráztak ki.*

II. Lombos fák és cserjék.

Abelia florida. Acer creticum sempervirens, Drummondi, insique, macrophyllum, mandschuricum, monspessulanum, platanoides f. Reitenbachi, pseudoplatanus fol. purp., palmatum f. atropurpureum, rubrum, tataricum. Actinidia chinensis, polygama. Aesculus californica, hippocastanum fl. pl., lutea, macrostachya, rubicunda. Acanthopanax ricinifolium. Akebia quinata, lobata. Amelanchier botryapium. Ampelopsis quinquefolia, Veitchii. Amorpha fruticosa. Amygdalus nana. Andromeda japonica. Aralia sinensis. Aristolochia siphon. Aronia arbutifolia. Artemisia Abrotanum. Asimina triloba. Azalea mollis, pontica. Aucuba japonica. Berberis aquifolium (Makonia), Thunbergi, vulgaris, vulg. fol. purp. Betula alba, dahurica, papyracea. Bignonia capreolata. Buddlea variabilis. Broussonetia papyrifera. Caragana arborescens. Carya alba, olivaeformis, sulcata. Callicarpa Giraldiana. Calycanthus floridus, praecox, occidentalis. Catalpa syringaefolia. Ceanothus azureus hybr. Celastrus scandens. Cephalanthus occidentalis. Cercidiphyllum japonicum. Cercis siliquastrum. Cedrela chinensis. Chamaebatiaria millefolium. Chionanthus virginica. Citrus trifoliata. Clematis lanuginosa hybr., montana. Clerodendron trichotomum.

Cletra acuminata, alnifolia. *Cornus alba* et f. *Spaethi*, *florida*, *macrophylla*, Nuttalli. *Coronilla emerus*. *Corylus colurna*. *Cotoneaster affinis*, *bacillaris*, *frigida*, *horizontalis*, *multiflora*, Simonsi. *Corollea cotoneaster*. *Crataegus azarolus*, *Carrieri*, *coccinea*, *crus galli*, *oxyacantha* fl. rubro pleno, *pirifolia*, *punctata*, *pyracantha*. *Cudrania tricuspidata*. *Cydonia japonica*, Manlei. *Daphne Mezeum*. *Daphniphyllum macropodium*. *Davidia involucrata*. *Desmodium penduliflorum*. *Deutzia crenata*, Kalmiae flora. *Dirca palustris*. *Diospyros Lotus*, Kaki, *virginiana*. *Edgeworthia papyrifera*. *Elaeagnus angustifolia*, *argentea*, *edulis*. *Elscholtzia Stauntoni*. *Enkianthus japonicus*. *Erica carnea*. *Exochorda grandiflora*. *Fagus americana*, *silvatica* f. *atropurp*. *Fontanesia phylliriooides*. *Forestiera accuminata*. *Forsythia suspensa*, *viridissima*. *Fortunea chinensis*. *Fraxinus excelsior*, *ornus*. *Genista ætnensis*, *praecox*. *Gleditschia caspica*. *Gymnocladus canadensis*. *Halesia tetraptera*. *Halimodendron argenteum*. *Hamamelis mollis*, *virginiana*. *Hibiscus syriacus*. *Hippophae rhamnoides*. *Hovenia dulcis*. *Hydrangea arborescens grandifl.* *paniculata grandifl.* *quercifolia*. *Hypericum calycinum*, *patulum*. *Idesia polycarpa*. *Ilex aquifolium*, *opaca*. *Itea virginica*. *Jasminum nudiflorum*, *revolutum*. *Juglans nigra*, *regia*, Sieboldiana. *Koelreuteria paniculata*. *Laburnum alpinum*, *vulgare*. *Leycesteria formosa*. *Ligustrum ibota*, *lucidum*, *ovalifolium*, Regelianum, *sinense*, *vulgare* f. *italicum*. *Liquidambar styraciflua*. *Liriodendron tulipifera*. *Lonicera Maaki*, Standiski. *Maclura aurantiaca*. *Magnolia acuminata*, *cordata*, *glauca*, *gracilis*, *hybr*. *Soulangeana*, *hybr*. *Lennea*, *hypoleuca*, *Kobus*, *macrophylla*, *ovovata*, *parviflora*, *salicifolia*, *stellata*, *Thompsoniana*, *tripetala*, *Yulan*. *Menispermum canadense*. *Myrica cerifera*. *Neviusia alabamensis*. *Nuttallia cerasiformis*. *Nyssa multiflora*, *silvatica*. *Orixa japonica*. *Oxydendron arboreum*. *Paederia Wilsonae*. *Paeonia arborea*. *Parrotia persica*. *Paulownia Fargesii*, *imperialis*. *Periploca graeca*. *Pernetia mucronata*. *Phellodendron amurense*. *Philadelphus coronarius*. *Photinia serrulata*, *villosa*. *Pirus malus* (cum sequ. formis: *coronaria*, *floribunda*, *Halliana*, *Niedzwetzkiana*, *Sargentii*), *pallveria*, *salicifolia*. *Plagiospernum sinense*. *Platanus orientalis*. *Potentilla fruticosa*. *Populus lasiocarpa*. *Prinus verticillata*. *Prunus Grayana*, *lusitanica*, *laurocerasus schipkaensis*, *padus*, *Sargentii*, *Siori*, *serotina*,

virginiana. *Quercus austriaca* sempervirens, Banisteri, maeranthera macrocarpa, pedunculata, pyrenaica, rubra. *Rhamnus imeretinus*, *Rhododendron arboreum* hybr., Cunninghami, maximum, ponticum. *Rhodotypos kerrioides*. *Rhus cotinus*, glabra et laciniata, Osbecki, typhina, vermicifera. *Ribes aureum*, Gordonianum, sanguineum. *Robinia hispida*, mexicana, villosa. *Rosa laevigata*, rubrifolia, rugosa. *Rubus bambusarum*, flagelliforus, kuntzeanus, laciniatus, odoratus, phoenicolasius, sulcatus. *Salix babylonica*, daphnoides, magnifica, lucida, purpurea pendula, repens. *Sassafras officinalis*. *Smilax rotundifolia*. *Sophora japonica*. *Sorbus aria*, aucuparia, chamaemespilus, cuspidata, domestica, torminalis. *Spiraea arguta*, ariaefolia, Bumalda, canescens myrtifolia, Lindleyana, opulifolia, prunifolia fl. pl., sorbifolia, Thunbergi, Van Houttei. *Stachyurus gracilis*. *Staphylea colchica*, pimata. *Stephanandra Tanakae*. *Styrax japonica*. *Stuartia pentagyna*, pseudocanallia. *Symplocoscrataegoides*. *Syringa amurensis*, Emodi, japonica, Jósikaea, persica, pekinensis, vulgaris. *Viburnum Carlesi*, cassinoides, dilatatum, lantana, lentago, macrocephalum, nudum, opulus fl. pl., rhtidophyllum, tomentosum, utile. *Wistaria chinensis*. *Xanthoceras sorbifolia*. *Xanthorrhiza apiiifolia*. *Xanthoxylon fraxineum*, Zelkova keaki. Összesen 310-féle lombos fa és cserje.

A fajok és fajták sokasága annál érdekesebb, mert a kert talaja hideg és ki van téve a Gyöngyös áradásainak. Amellett Szombathely vidékének klímája már megérzi az Alpesek közelségét.

A fennsík, melyen a jászlói major áll, még inkább érzi az alpesi hatást. Épen ezért különös figyelmet érdemel a *Pinus Pinaster*-erdő a jászlói major mellett. Sághy István dr. ur kísérlete pompásan bevált: a fák egészségesek és az idősebbek javában hozzák tobozaikat. Magyarország erdészeti jelentőségű fáinak száma ezzel egy meglepő adattal gyarapodik.