

# A NYÁR ÉS FŰZ SZAPORÍTÓANYAG KONCENTRÁLT TERMELÉSÉNEK HELYZETE

Dr. Papp  
László

A nyár és fűz szaporítóanyag termelésének átállítása a 11/1969. MÉM rendeletnek megfelelően sok nehézséggel történt. Az átmeneti időszakban zavarok jelentkeztek mind az ültetési anyag, mind a dugvány ellátásban.

1971 őszén harmadízben végeztük el a nyár és fűz szaporítóanyag termelésének ellenőrzését és minősítését. A munka során szerzett tapasztalatok alapján nyugodtan meg lehet állapítani, hogy az átmeneti nehézségek korszaka lezárult. Nézzünk először néhány termelési adatot ennek igazolására.

## ALAPANYAGTERMELÉS

A nyár szaporítóalanyagot három, a fűzét egy törzsanyatelep hivatott előállítani. A három nyártörzsanyatelep közül a derecskei és a bánkúti termelése beállt. A bajti törzsstelep létesítése 1971 tavaszán történt meg.

A törzsanyatelepeken 1971 őszén minősített simadugvány mennyiségét az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat

### A törzsanyatelepek termelése

Törzsanyatelep	'I-214'		O. ny.		Ko. ny.		Fűz	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	1000 db							
Derecske .....	500	1870	480	1200	230	486	—	—
Bánkút .....	560	1506	410	1400	270	111	—	—
Bajti .....	620	260	420	72	—	—	—	—
Béda .....	—	—	—	—	—	—	3000	510
Országosan .....	1680	3636	1310	2692	500	597	3000	510

A nyár törzsanyatelepek már 1972 őszén sokkal több dugványt szolgáltatnak, mint amennyi a körzeti keretek alpanyagszükséglete. A felesleg olasznyárból mintegy 2,0 millió, az óriásnyárból 1,4 millió. Holott a bajti törzsanyatelep első évi termelése még nem számottevő. A bédai fűz-törzsanyatelepet 1970-ben kezdték telepíteni, 1972-ben bővítették és még tovább bővül. Termelési feladatának előreláthatólag két év múlva eleget tud tenni.

**Ültetési anyag termelés.** A 26 engedélyes csemetekertben minősített anyagot a 2. táblázat összesíti. Vagyis kerekén 9,5 millió gyökeres dugvány áll rendelkezésre. Ez 1,0 millióval több, mint amit az erdőrendezőség 1973. évre szükségként megadott.

2. táblázat

**Ültetési anyagtermelés**

Fajta	Dugványozva		Minősítve 1000 db		Kihozatal		
	ha	1000 db	I. oszt.	II. oszt.	1000 db	db/ha	%
			gyökeres dugvány				
'I-214'.....	157,2	8 811	3376	2296	5672	36 000	64
Óriásnyár .....	88,2	5 236	2129	1370	3499	39 000	66
Korainyár .....	11,5	855	260	223	370	33 000	45
Együtt .....	257,5	14 902	5765	3889	9545	37 000	64

A felesleg onnan ered, hogy sok csemetekertben most sem különítették el a szaporítótelepet és a dugványtermesztésre hivatott anyagot is gyökeres ültetési anyagként leltározták fel.

Örvedetes jelenség viszont, hogy a dugványkihozatal 64<sup>0</sup>/<sub>0</sub>-ra emelkedett. Holott 1970-ben 50, 1971-ben 58<sup>0</sup>/<sub>0</sub> volt ez az érték. És hogy ennek további növelésére milyen lehetőség van, mutatja néhány csemetekert, ahol a 80<sup>0</sup>/<sub>0</sub>-ot is elérték.

Örvedetes jelenség az is, hogy az I. és II. osztályú ültetési anyag egymáshoz viszonyított aránya lényegesen megváltozott. Míg az elmúlt években az első osztályú anyag aránya a 30<sup>0</sup>/<sub>0</sub>-ot sem érte el, a fenti táblázat alapján ez a szám 61<sup>0</sup>/<sub>0</sub>. És ez is tovább növelhető. Jó példa erre a bánkúti csemetekert, ahol a termelt ültetési anyag 71<sup>0</sup>/<sub>0</sub>-a I. osztályú.

**SIMADUGVÁNYTERMELÉS**

A jövő évi gyökereztetéshez szükséges simadugványt az engedélyes kertekben szaporítótelepen kellett volna megtermelni. Az 1971. évi őszi becslés szerint van:

'I-214'	2670 ezer db
Óriásnyár	2063 ezer db
Korai nyár	260 ezer db
összesen:	4993 ezer db

Mint láttuk, a törzsanyletelepek feleslege kerekén 3,5 millió. Így 8,5 millió db simadugvánnyal lehet számolni. A hiány kb. 4,0 millió db. A feleslegben levő gyökeres anyagból azonban ez pótolható.

Megállapítható tehát, hogy a nemesnyár szaporítóanyag-termelése egyenesbe jutott. A faalakú fűzek tekintetében még kedvezőtlen a helyzet. A következő évben azonban már ez is helyreigazodhat.

Az ellenőrzés során azt is meg lehetett állapítani, hogy a termelő kertek nem minden esetben kapták meg azt a keretszámot, amire termelésüket rá kellett volna állítani. Rendkívül fontos e tekintetben a rendeletben előírt koordinálás elvégzése. Különben könnyen megtörténhet, hogy ahol most felesleg van, kevesebbet dugványoznak és a jövő évben ismét hiány léphet fel.

Nagy baj az is, hogy a termelő üzemek nem tartják be minden esetben a technológiai fegyelmet. A nyár és fűztermelő kertek száma 26. Üzemterv 15 kertre készült. A többire vonatkozólag üzemtervi útmutató áll rendelkezésre. Ahol az üzemterv előírásait megtartják, mind az ültetési anyag minőségében, mind a kihozatalban ugrásszerű változás következett be. Jó példa erre többek között a bánkúti, derecskei, dánosi, ásványrári csemetekert.

Az egészségügyi ellenőrzés során különösebb probléma nem merült fel. A délvidek egyes csemetekertjeiben erős jégverés volt. A sebek azonban idejében beforrtak. A bánkúti törzsanyatelepen van még erősebb rovarfertőzés. A gondos permetezés folytán azonban egy év alatt lényeges javulás következett be.

A nyár és fűz szaporítóanyag termelés helyzete tehát megnyugtató. A termelés korszerűsítésére tett intézkedések helyesnek bizonyultak.

634.0.174.475.2:632.954.001.4

**VEGYSZERES GYOMIRTÁSI  
KÍSÉRLETEK EGYÉVES  
ELEGYES  
FENYŐTELEPÍTÉSBN**

*Kovács  
József*

Az Egyházaskozár-szászvári „Haladás” MTSZ üzemi meliorációs terve mintegy 1000 ha erodált lejtős területnek erdővel való betelepítését írja elő. E program mintegy évi 70 ha első kivitelű erdősítéssel valósul meg. A telepítés, annak ápolása és a 300 ha-t meghaladó befejezetlen erdősítés ápolása a mi üzemünkben gyakorlatilag teljesen gépesített. Padkás talajelőkészítés ősszel, tavasszal rotációs kapás talajművelés, gépi ültetés, vegyszeres gyomirtás traktoros permetezővel. A talajfertőtlenítőszer gépi kijuttatása és bedolgozása még nem teljesen megoldott.

Az erdőtelepítés eredményességét döntően meghatározó ápolási munkák végrehajtásának bizonytalansága az ágazatra jellemző munkaerőhiány miatt a telepítés eredményes műszaki átadását kockázatosná teszi. Az első évre előírt kétszeri kézi ápolási munkát vegyszeres gyomirtással kellett helyettesítenünk.

1972 tavaszán telepítettünk a fent leírt módon először nagy területen (44 ha) elegyes fenyőerdőt. A tavasz folyamán tanulmányoztuk azokat a helyeket, ahol már foglalkoztak erdősítésben vegyszeres gyomirtással. A lomblevelű erdőknél egyértelmű pozitív eredményeket tapasztaltunk. Fenyőfélék vegyszeres gyomirtását illetően kevés próbálkozással találkoztunk, s megoszlottak a vélemények. Az az álláspont volt uralkodó, hogy első éves telepítésű fenyőknél eredményesen nem alkalmazható. Üzemi adottságunk diktálta kényszer hatására mégis pár ezer négyzetméteres területen különböző dózisban *Aktikon* és *Buvinol* gyomirtószerekkel állítottunk be kísérleteket.