

ben is. Russ könyvei a szobamadarakról méltán örvendenek nagy elterjedtségnek. A hazai szobamadarakról írott könyve fekszik előttünk ötödik kiadásában. NEUNZIG K., a „Gefiederte Welt“ szerkesztőjének átdolgozásában. Benne találjuk mindazt ritka alapos-sággal, mire egy madárbarátnak kedvencei ápolásában szüksége van, teljesen modern alapon. Az új kiadás Európa összes madarait tartalmazza, amennyiben fogságban tarthatók. Újítás továbbá hogy a madarak leírásánál ott találjuk azok súlyát is, mire a madárbarátnak sokszor szüksége van. A könyv kiállítása igen izlées, számos háromszín-nyomatú táblái — NEUNZIG kezemunkája — pompásaknak mondhatók. Minden madárbarát a legnagyobb gyönyörűséggel fogja forgatni e könyvet.

Handbuch des Vogelschutzes von Dr. Karl R. Henricke. Mit 9 Tafeln in Doppeltondruck, 1 Karte und mehr als 200 Textabbildungen. Geheftet in buntem Umschlag 6.50 M, feiu gebunden 7.50 M. Creutzsche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

„A madárvédelem kézikönyve“ legjobb bizonyítéka a madárvédelem eszméjének gyors elterjedésének. A hatalmas kötet öt könyvre oszlik. Az első könyv a madárvédelem szükségességéről szól, a második könyv a madárvédelmet megokolja, ethikai, aesthetikai és gazdasági szempontból, a harmadik a madárvédelem gyakorlati alkalmazását adja, a negyedikben a madárvédelem történetét találjuk (HERMANN REZSŐ tollából), az ötödik a madárvédelmi törvényeket ismerteti az európai államokban. Szerző ebben a nagy munkájában az idevágó irodalmat nagy körültekintéssel használta fel a legújabb időkig — úgy hogy munkája — mely különben is nem csupán általánosan ismert dolgokat tár az olvasó elé, mindenkoron forrásmunkául fog szolgálni.

Natur ein treuer Beschützer der Vögel sein. Russ' Bücher über Stubenvögel erfreuen sich mit Recht einer grossen Verbreitung. „Die einheimischen Stubenvögel“ liegen uns in der fünften Auflage, völlig umgearbeitet von K. NEUNZIG, Herausgeber der „Gefiederten Welt“, vor. Wir finden im Buche mit seltener Gründlichkeit auf ganz moderner Grundlage alles, was ein Vogelfreund zur Pflege seiner Lieblinge braucht. Die neue Auflage enthält sämtliche europäischen Vögel, insofern sie als Stubenvögel in Betracht kommen. Eine Neuerung ist, dass wir bei der Beschreibung der Vögel auch deren Gewicht finden, was einem Vogelfreund oft nützlich zu wissen ist. Die Ausstattung des Buches ist sehr geschmackvoll, die zahlreichen Dreifarben-Drucke von NEUNZIG'S Hand sind vortrefflich zu nennen. Jeder Vogelfreund wird mit Vergnügen das Buch in die Hand nehmen.

Ein „Handbuch des Vogelschutzes“ ist der beste Beweis der schnellen Verbreitung der Vogelschutz-Idee. Der stattliche Band teilt sich in fünf Bücher. Das erste Buch behandelt die Notwendigkeit des Vogelschutzes; im zweiten Buche finden wir die Begründung des Vogelschutzes vom ethischen, ästhetischen und wirtschaftlichen Standpunkte; das dritte Buch beschäftigt sich mit der Ausführung des Vogelschutzes, das vierte gibt die Geschichte des Vogelschutzes (bearbeitet von RUDOLF HERMANN); das fünfte Buch schildert die Vogelschutz-Gesetzgebung in den europäischen Staaten. Verfasser benutzte in diesem grossen Werke mit grosser Umsicht die diesbezügliche Literatur bis zum heutigen Tage, so dass sein Werk — welches nicht nur allgemein Bekanntes dem Leser bietet — immerdar ein Quellenwerk bleiben wird.

NECROLOGUS.

Blasius Vilmos.

1845—1912.

Homlokegyenest ellentéte bátyjának, az igazi „Field-Ornitholog“-nak, a hogyan magát az ifjabb, fegyverrel bano (és a „börtanulmányokat“ végző) ornithologus nemzedék előszeretettel nevezi. BLASIUS RUDOLF (1842) csupa tűz, fékezhetetlen munkakedv és munkakerő, a ki kongresszusok közvetlen előestéjén is beugrott hiányzó referens helyére és a szó szoros értelmében véve „máról holnapra“ egészen elfogadható referátumot készített. BLASIUS VILMOS (1845) ezzel szemben maga a megfontoltság, a melynek magas fokát okozta, hogy az ornithologia egyetemes mezején gazdag és alapos ismeretei dacára aránylag oly keveset publikált. NEHRKORN A. publikációinak számát „mintegy negyvenre“ becsüli s kiemeli közülök az *Alca impennis*-ről és a malayi archipelagns madarairól szólót (Journ. f. Ornithologie LX. Nr. 4. pag. 620.). Engedelmes fia volt kiváló atyjának, BLASIUS HENRIK hírneves zoologusnak, a kinek óhajára RUDOLF bátyja helyett elfoglalta és megtartotta haláláig Braunschweigban a Collegium Carolinum tanszékét. BLASIUS VILMOS halálával egyelőre megszakad az ilyenfajta zoologusok sora.

BLASIUS VILMOS nem egykönnyen maradt távol az ornithologusok bármely gyűlésétől. Hozzánk a II. nemzetközi ornithologiai Kongresszus hozta 1891-ben; mindig ragaszkodó is maradt. Mindenkor felvilágosítólag és békítőleg hatott; szelidségével prototypusa volt a német közmondásnak: „Mit dem Hut in der Hand, kommt der Deutsche durch das Land“.

Tisztelet emlékének!

H. O.

Wilhelm Blasius.

1845—1912.

Der gerade Gegensatz seines Bruders, des echten „Field-Ornithologen“, wie sich die jüngere ornithologische, mit dem Gewehr vertraute (und das „Balgstudium“ treibende) Generation so gerne nennt. RUDOLF BLASIUS (1842) lauter Feuer, eine unzählbare Arbeitslust und Kraft, der selbst am Vorabende von Kongressen für einen fehlenden Referenten einsprang und wirklich von „heut auf morgen“ ein annehmbares Referat zustande brachte. WILHELM BLASIUS (1845) dagegen die Bedächtigkeit selbst, deren sehr hoher Grad wohl schuld daran war, dass er trotz reichem und gründlichem Wissen auf dem Gebiet der gesamten Ornithologie verhältnismässig so wenig publiziert hat. A. NEHRKORN gibt die Zahl seiner Publikationen auf „einige vierzig“ an und hebt diejenige über *Alca impennis* und über die Vögel des Malayischen Archipels hervor (Journ. f. Ornith. LX. Nr. 4. pag. 620.). Er war der folgsame Sohn seines vortrefflichen Vaters, des berühmten Zoologen HEINRICH BLASIUS, auf dessen Wunsch er statt des Bruders RUDOLF den Lehrstuhl am Collegium Carolinum in Braunschweig annahm und bis zu seinem Ableben behielt. Mit dem Tode WILHELM BLASIUS schliesst vorläufig die Reihe der Zoologen dieses Geschlechtes ab.

WILHELM BLASIUS fehlte nicht leicht an irgend einer Versammlung der Ornithologen. Zu uns brachte ihn der II. internationale Ornithologische Kongress vom Jahre 1891 und bewahrte er uns stets grosse Anhänglichkeit. Er wirkte stets aufklärend und ausgleichend und war mit seiner Milde das Prototyp des deutschen Volkswortes, welches sagt: „Mit dem Hut in der Hand, kommt der Deutsche durch das Land.“

Ehre seinem Andenken!

O. H.

Dr. Greisiger Mihály.

F. év szept. 10-én elveszítette a M. Kir. Ornith. Központ egyik legrégebb s legderekasabb megfigyelőjét, Dr. GREISINGER MIHÁLYT, Szepesbela város tiszti főorvosát, levelező tagot. Az elsők között volt, kik az Ornith. Központ mellé csatlakoztak. Résztvett az 1890-iki mintamegfigyelésekben. Szűkebb hazájának, e szép Szepesség ornisának tanulmányozásával foglalkozott, ennek eredménye: „Die Vögel von Béla und Umgebung“ és „A madarak költözése Szepesvármegyében“. Intézetünk 1897-ben levelező taggá választotta.

Nyugodjék békében!

Dr. Michael Greisiger.

Am 10. September laufenden Jahres verlor die Königl. Ung. Ornith. Centrale einen ihrer ältesten und wackersten Beobachter, das korrespondierende Mitglied, Oberstadtarzt Dr. MICHAEL GREISINGER. Er war einer der Ersten, die sich um die Ornith. Centrale scherten, nahm an den Musterbeobachtungen im Jahre 1890 teil. Befasste sich mit dem Studium der Ornis seiner engeren Heimat, der schönen Zips, als dessen Resultat erschienen: „Die Vögel von Béla und Umgebung“ und „A madarak költözése Szepesvármegyében“. Unser Institut wählte ihn 1897 zum korrespond. Mitglied.

Er ruhe in Frieden!



KŐRÖSSZEGI ÉS ADORJÁNI
GRÓF CSÁKY ALBIN V. B. T. T.
1841—1912.

Folyóiratunk jelen kötete lezárásának pillanatában vesszük a gyász hírt a M. Kir. Ornithologiai Központ megalapítójának 1912. december 15-én bekövetkezett haláláról. Lelkünk mélyéig megrendülve állunk mi is a gyászolók sorába. A nemes és talpig férfiú elhúnyt érdemeinek beható méltatását folyóiratunk XX-ik kötetére kell halasztanunk.

A M. KIR.
ORNITHOLOGIAI KÖZPONT.



GRAF ALBIN CSÁKY
VON KÖRÖSSZEG UND ADORJÁN

GEHEIMRAT SR. MAJESTÄT DES KÖNIGS VON UNGARN
1841—1912.

Im Augenblick, wo wir den XIX. Band unserer Zeitschrift abschliessen, geht uns die Nachricht des Ablebens am 15. Dezember 1912 des Begründers der Königl. Ungarischen Ornithologischen Centrale zu. Bis ins Innerste unseres Herzens betrübt, stellen wir uns in die Reihe der Trauernden. Eine ausführliche Würdigung dieses edlen und ganzen Mannes müssen wir auf den folgenden XX. Band verschieben.

DIE KÖNIGL. UNG.
ORNITHOLOGISCHE CENTRALE.

INDEX ALPHABETICUS AVIUM.

- A**
Accentor modularis (L.) 130, 145, 413, 477.
Accipiter nisus (L.) 396, 397, 401, 402, 411, 433, 436, 448, 472, 484.
Acrocephalus arundinaceus (L.) 130, 146, 344.
 — *dumetorum* Blyth, 478.
 — *streperus* (Vieill.) 131, 146.
Aegithalus caudatus (L.) 385, 412, 467, 477, 484.
Aix sponsa (L.) 464.
Alauda arborea L. 118, 144, 344, 435, 468.
 — *arvensis* L. 49, 118, 143, 144, 147, 151, 155, 156, 160, 215, 245, 253, 254, 339, 342, 344, 435, 460, 461, 468, 477.
 — *cristata* L. 215, 243, 253, 254, 304, 306, 307, 309, 344, 412.
Alcedo ispida L. 466.
Ampelis garrulus (L.) 109, 143.
Anas boscas L. 56, 143, 144, 147, 273, 277, 282, 283, 298, 305, 306, 307, 342, 451, 469, 470, 472, 477.
 — *crecca* L. 57, 143, 144, 289, 298, 305, 306, 307, 470.
 — *penelope* L. 56, 144, 273, 283, 298, 305, 306.
 — *querquedula* L. 56, 144, 342, 470.
 — *strepera* L. 56, 143, 144.
Anorthura troglodytes Renn, 216, 222, 248, 253, 254.
Anser albifrons (Scop.) 57.
 — *anser* (L.) 57, 144, 285, 297, 342, 343, 344, 469, 477.
 — *fabalis* Lath. 57, 144, 147.
 — *neglectus* (Sushkin) 285, 297.
Anthus campestris (L.) 121, 146.
 — *pratensis* (L.) 122, 143, 145, 216, 245, 253, 254, 304, 306, 413, 433, 477.
 — *spioletta* (L.) 121.
 — *trivialis* (L.) 26, 121, 146, 468, 473, 477.
Aquila chrysaëtus L. 285, 298, 305, 306, 307, 319, 457.
 — *maculata* (Gm.), 87, 145.
 — — *pomarina* Brhm. 344, 448.
 — *melanaëtus* (Gm.) 87, 143, 441, 484.
Archaeopteryx 451.
Archibuteo lagopus (Brünn.) 86, 285, 298, 306, 307.
Ardea alba L. 75, 144, 334.
 — *cinerea* L. 49, 50, 73, 143, 145, 148, 152, 160, 297, 305, 306, 332, 334, 336, 337, 342, 344, 406, 468, 470, 471.
 — *garzetta* L. 332, 344.
Ardea purpurea L. 75, 145, 332, 336, 337, 338, 344, 354, 360, 471.
 — *ralloides* Scop. 73, 146, 332, 334, 336, 337, 338, 344, 356, 471.
Ardetta minuta (L.) 73, 146, 332, 336, 344, 471.
Asio accipitrinus (Pall.) 275, 280, 282, 283, 301, 305, 307, 308, 466, 471.
 — *otus* (L.) 344, 402, 404, 466, 469, 470.
Astur palumbarius (L.) 471, 484.
B
Bonasa bonasia (L.) 468.
Botaurus stellaris (L.) 73, 143, 145, 454.
Branta ruficollis (Pall.) 273, 283, 297, 305, 306.
Bubo bubo (L.) 430, 437, 465, 469, 470.
Buteo buteo (L.) 86, 143, 144, 344, 402, 448, 460.
 — *ferox* (Gm.) 464.
C
Caccabis saxatilis (Mayer) 469, 470.
Calamodus melanopogon (Temm.) 131, 145.
 — *schoenobaenus* (L.) 216, 248, 253, 254.
Calcarius nivalis (L.) 304, 306, 307, 308, 309.
Cannabina cannabina (L.) 143, 216, 240, 253, 254, 276, 344, 413.
 — *linaria* (L.) 117, 143, 413, 474, 477.
Caprimulgus europaeus L. 98, 146, 466, 471.
Carduelis carduelis (L.) 143, 216, 241, 253, 254, 276, 402, 412, 435, 460.
Ceratophora carunculata 23.
Cerchneis cenchris (Naum.) 461.
 — *tinnunculus* (L.) 87, 143, 144, 274, 277, 282, 283, 298, 305, 307, 344, 406, 436, 465, 470.
 — *vespertinus* (L.) 87, 146, 343, 344, 375, 402, 404, 406, 484.
Certhia familiaris L. 383, 385, 390, 412.
Charadrius alexandrinus L. 342, 344, 361.
 — *dubius* Scop. 57, 145.
 — *pluvialis* L. 57, 145.
Chelidonaria urbica (L.) 45, 46, 100, 146, 149, 152, 155, 156, 157, 160, 344, 362, 372, 456, 459, 460, 466, 471, 472, 473, 478.
Chloris chloris (L.) 117, 143, 144, 344, 402, 412, 435.
Chrysomitris spinus (L.) 117, 276, 413, 435, 460.
Ciconia ciconia (L.) 3, 4, 11, 16, 23, 48, 69, 145, 148, 152, 155, 156, 157, 160, 323, 328, 344, 345, 457, 468, 469, 470, 476.
 — *nigra* (L.) 69, 145, 147, 152, 160, 344.
Cinclus cinclus (L.) 467.
Circæëtus galliensis (Gm.) 449, 470.
Circus aeruginosus (L.) 86, 145, 344, 471.
 — *cyaneus* (L.) 86, 144, 298, 305, 306, 307.
 — *pygargus* L. 86, 145.
Clivicola riparia (L.) 99, 470, 471, 477.
Coccothraustes coccothraustes (L.) 385, 412.
Colæus monedula (L.) 275, 280, 283, 302, 305, 307, 309, 459.
Columba domestica L. 213, 216, 233, 253, 254, 268, 287.
 — *livia* Briss. 461, 470, 471.
 — *oenas* L. 49, 50, 75, 143, 144, 148, 151, 155, 156, 160, 344, 468, 470.
 — *palumbus* L. 49, 50, 75, 143, 144, 148, 151, 160, 287, 295, 412, 468, 470, 472, 473.
Colymbus cristatus L. 55, 145, 342.
 — *fluviatilis* Tunst. 55, 143, 145, 469.
 — *septentrionalis* (L.) 213.
Coracias garrula L. 51, 97, 146, 152, 160, 383, 466.
Corvus corax L. 276, 277, 282, 283, 302, 305, 307, 308, 461, 470.
 — *cornix* L. 2, 344, 402, 411, 412, 471, 473, 475.
 — *frugilegus* L. 111, 342, 344, 413, 470, 477, 484.
Coturnix coturnix (L.) 45, 47, 143, 146, 148, 152, 155, 156, 296, 435, 468, 471.
Crex crex (L.) 45, 47, 66, 146, 152, 160, 275, 283, 284, 300, 305, 307, 309, 477, 478.
Cuculus canorus L. 44, 48, 87, 146, 149, 152, 155, 156, 157, 158, 160, 406, 413, 448, 459, 466, 473, 474, 478.
Jyanecula suecica (L.) 140, 145, 375, 477.
 — — *leucocyanea* Brhm. 477.
Cygnus cygnus (L.) 288, 314, 464, 477.
 — *olor* (Gm.) 464.

- Dafila acuta** (L.). 57. 144. 342.
Dendrocopus major (L.). 216. 235. 253. 254. 302. 305. 307. 309. 385. 390. 409. 410. 412.
 — **medius** (L.). 289. 302. 305. 307. 309. 410. 412.
 — **minor** (L.). 344. 385. 412. 473.
Dryocopus martius L. 484.
- Emberiza calandra** L. 117. 143. 144. 216. 242. 253. 254. 304. 306. 435. 468.
 — **cia** L. 435. 470.
 — **circus** L. 435.
 — **citrinella** L. 345. 385. 412. 435.
 — **hortulana** L. 435. 468.
 — **schoeniclus** L. 117. 143. 144. 435. 477.
Eritacus rubecula (L.) 139. 143. 145. 152. 160. 345. 385. 412. 435. 448. 459. 470. 477.
Endyptes chrysocome 213. 220. 224.
- Falco merillus** (Gerini). 87. 289. 298. 305. 307. 345. 396. 402.
 — **peregrinus** Tunst. 471.
 — **subbuteo** L. 87. 145. 465.
Fringilla coelebs L. 117. 143. 144. 345. 385. 411. 448. 459. 460. 462. 470. 477.
 — **montifringilla** L. 117. 345. 385. 457. 468. 474. 477.
Fulica atra L. 68. 143. 144. 216. 232. 253. 254. 342.
Fuligula clangula (L.). 56.
 — **ferina** (L.). 56. 144. 298. 305. 306.
 — **fuligula** (L.). 56. 144.
 — **nyroca** (Güld.) 56. 143. 144.
- Gallinago gallinago** (L.). 60. 143. 144. 295. 301. 305. 307. 309. 313. 472.
 — **gallinula** (L.). 60. 143. 144.
 — **major** Gm. 60. 145. 352.
Gallinula chloropus (L.). 68. 143. 145. 216. 231. 253. 254. 465. 468.
Gallus domesticus L. 213. 288. 314.
Garrulus glandarius (L.). 345. 402. 413. 471. 473.
 — **infaustus** Viell. 275.
Gavia arctica (L.). 55. 451. 484.
 — **septentrionalis** (L.). 55.
Glareola melanoptera (L.). 23.
 — **pratincta** (L.) 342.
Glaucidium noctuum (Retz.) 345. 365. 383. 390. 412. 436. 437. 465.
Grus grus (L.). 45. 47. 65. 145. 152. 160. 469. 470. 477.
- Haematopus ostrilegus** L. 452.
Haliaetus albicilla (L.) 213. 345.
Himantopus himantopus (L.) 342.
- Hirundo rustica** L. 25. 44. 45. 104. 145. 149. 152. 155. 156. 157. 158. 160. 216. 236. 253. 254. 338. 345. 362. 369. 406. 439. 459. 466. 470. 471. 472. 473. 475. 477.
Hoplopterus 451.
Hydrochelidon leucoptera (Meissn. et Schinz). 339. 342. 345.
 — **nigra** (L.) 55. 146. 331. 342. 345. 361.
Hypolais hypolais (L.) 131. 146. 345. 402. 413. 472.
- Jynx torquilla** L. 51. 92. 146. 152. 157. 160. 216. 234. 253. 254. 345. 383. 384. 390. 391. 409. 412. 466.
- Lagopotetrix Dicksonii** 299.
Lagopus bonasioides 299.
 — **Islandorum** (Fab.) 310.
 — **lagopus** L. 274. 277. 280. 281. 282. 283. 289. 292. 299. 305. 307. 308. 310. 311. 314. 319.
 — **mutus** (Montin) 275. 277. 280. 281. 282. 283. 284. 289. 300. 305. 307. 308. 310. 319.
 — **Reinhardi** (Brehm). 310.
 — **scoticus** (Lath.). 310.
Lanius collurio L. 111. 146. 152. 160. 345. 396. 402. 405. 412. 454.
 — **excubitor** L. 396. 484.
 — **minor** Gm. 111. 146. 286. 296. 471.
 — **senator** L. 464. 467.
Larus argentatus Brünn. 216. 459.
 — — **michael'esi** Brünn. 226. 253. 254. 459. 461. 463.
 — **canus** L. 55. 144. 469. 470.
 — **minutus** Pall. 55. 146. 473.
 — **priscus** 301.
 — **ridibundus** L. 12. 55. 143. 144. 216. 227. 253. 254. 275. 283. 301. 305. 307. 309. 330. 345. 349. 469. 470. 477. 484.
Limosa limosa (L.). 339. 342. 345.
Locustella fluviatilis (Wolf). 131. 146.
 — **naevia** (Bodd.). 131. 146.
Loxia curvirostra (L.). 117. 304. 307. 309.
 — **bifasciata** Brhm. 477.
Luscinia luscinia (L.) 45. 47. 140. 150. 152. 157. 160. 345. 400. 402. 411. 459. 460. 467. 471. 472. 473. 475. 478.
 — **philomela** (Bechst.) 47. 142. 146.
- Machetes pugnax** L. 216. 229. 253. 254.
Mergus albellus L. 56.
 — **merganser** L. 56. 273. 283. 298. 305. 306.
Merops apiaster L. 93. 146. 471.
- Micropus apus** (L.). 99. 146. 147. 302. 305. 306. 345. 390. 413. 435. 459. 460. 461. 466. 471. 473. 478. 484.
 — **melba** (L.). 471.
Milvus migrans (Bodd.). 86. 145. 478.
 — **milvus** (L.). 86. 144.
Monticola saxatilis (L.) 135. 448.
 — **solitaria** (L.). 469. 470. 471.
Motacilla alba L. 49. 122. 144. 150. 151. 153. 155. 156. 157. 160. 345. 367. 378. 383. 385. 390. 402. 405. 412. 456. 468. 470. 472. 473.
 — **boarula** Penn. 49. 126. 143. 145. 152. 160. 345. 412. 468. 472.
 — **flava** L. 51. 128. 143. 145. 216. 245. 253. 254. 345. 413.
 — — **borealis** Sundev. 150.
Muscicapa atricapilla L. 110. 216. 233. 253. 254. 413. 478.
 — **collaris** Bechst. 110. 146. 383. 384. 390. 393. 409. 412. 471.
 — **grisola** L. 109. 146. 345. 378. 383. 385. 390. 402. 409. 412. 454. 472. 473.
 — **parva** Bechst. 111. 146. 413.
- Neophron percnopterus** L. 458. 471.
Nucifraga caryocatactes (L.). 280. 303. 306. 307. 393. 413. 435. 447. 472. 473. 477.
 — — **macrorhyncha** Brhm. 276. 278. 280. 282. 283. 303. 306. 307. 309. 319. 393. 462. 467. 484.
Numenius antiquus (M. Edw.) 301.
 — **arcuatus** (L.). 60. 143. 144. 470. 471. 477.
 — **gypsum** Gervais 301.
 — **phaeopus** (L.). 60. 145. 275. 301.
 — **tenuirostris** (Vieill.) 275. 301.
Nyctea tengmalmi (Gm.) 275. 282. 283. 302. 305. 306. 463.
Nyctea ulula (L.) 275. 278. 282. 283. 303. 305. 307. 309.
 — **scandiacae** (L.) 301. 302. 305. 306. 308.
Nycticorax nycticorax (L.). 73. 145. 332. 333. 335. 337. 338. 345. 356. 471.
- Oedienemus oedienemus** (L.). 59. 145. 468.
Opisthocomus cristatus 451.
Oriolus oriolus (L.). 45. 48. 111. 146. 149. 152. 155. 156. 160. 345. 402. 406. 412. 466. 472. 473. 478.
Ortygometra parva (Scop.) 68. 145. 342.
 — **porzana** (L.). 68. 146. 342. 345. 471.
 — **squilla** (Pall.). 68. 145. 342. 345.
Otis tarda (L.). 65. 210. 342.
Otocorys alpestris (L.) 121. 477.