

II. tábla.

1 (a-c) *Bythinia Bodosensis* Roth sp. nov., mintegy hétszeres nagyításban és (c) természetes nagyságban, a természetben a szájnílás fent valamivel hegyesebb; (in ee. 7-facher Vergrößerung und natürlicher Grösse (c), die Mundöffnung ist in der Natur oben etwas spitziger).

2. (a-c) *Limneus cf. acuarius* Neum., mintegy hétszeres nagyításban és (c) természetes nagyságban, a belső ajak felső része a rajzban igen erősen van kitüntetve; (in ee. 7-facher Vergrößerung und natürlicher Grösse (c), der obere Theil der Innenlippe erscheint in der Zeichnung zu kräftig hervorgehoben).

3. *Valvata (Tropidina) Eugeniae* Neum., négyszeres nagyításban, (in 4-facher Vergrößerung).

4. (a-b) *V. (Trop.) cf. Eugeniae* Neum., négyszeres nagyításban, (in 4-facher Vergrößerung).

5. (a-b) *Unio* sp. (nov.?)

6. *Unio* sp.

7. (a-c) *Congeria exigua* Roth sp. nov.

8. (a-d, a-d,) *Congeria cristellata* Roth sp. nov.

5—8. áb. természetes nagyságban, (in natürlicher Grösse).

Az eredeti példányok a m. kir. földtani intézet gyűjteményeiben vannak. (Die Original-Exemplare befinden sich in den Sammlungen des königl. ungar. geologischen Institutes.)



