

PLANTAE NOVAE.

Auctore VICTORE DE JANKA.

1. Avena decora Janka.

Avena Besseri autor fl. transsilv. et hung. — non Ledeb. Fl. ross.

Culmi elati 2—3-pedales; folia latiuscula applanata vel laxe convoluta, supra (intra) ad nervos circiter 18 cartilagineos dense hirtula. Ligula brevissima transverse linearis ciliato-lacerata, angulis saepius pilis paulo longioribus penicillata. Panicula composita multispiculata nutans. Spiculae 3—4 florae. Gluma inferior 1-, superior 3-nervis. Axis flosculorum omnium aequaliter barbato-pilosa. Palea inferior dorso glabra nitida sublaevis apice simpliciter acuta, *integra*.

Avena Besseri Ledeb. Fl. ross. IV. pag. 415 ex specimine ab ipso Bessero cum Kitaibelio communicato (Herb. Kit. Fascie. LVII n. 42) est gramen multo tenuis foliis complicato-setaceis, cui Besser in Enum. pl. Volhyn. etc. pag. 6. vaginas basilares persistentes longissime strictas laxas attribuit, quæque præter culmum humilem pedalem, paniculam valde depauperatam aequalem panicifloram — præsertim palea inferiore opaca sublente crebre punctato-exasperata apice cuspidato-lacerata valde recedit. Hæc Besseri planta mihi omnino eadem videtur cum Avena desertorum Lessing secundum specimen altaicum Ledebourianum herbarii Sadleriani mus. nat. hung., in quo ligulam ex Fl. ross. (l. c.) elongatam «1 lin. longam» frustra quæsivi.

2. Sesleria Sadleriana Janka.

S. coerulea Sadler Fl. comitat. Pest non alior.

S. Heufleriana fl. hung.

«Spica elongata, laxior, spiculae majores, glumæ et paleæ breviter aristatae, aristæ glumis 4—5-plo, paleis vero 3—4-plo breviores» Borb. in oesterr. bot. Ztschft. 1883 p. 30.

In Sesleria Heufleriana vera transsilvanica: «glumæ in aristam aequivel subæquilongam sensim attenuatae, aristæ paleam parte tertia aut dimi-

dia longiores. Spica magis compacta et ob aristas longiores quasi echinata». Borb. l. c.

3. *Ornithogalum millegranum Janka.*

O. prætextum Neilreich Aufzählung pag. 52 in nota (non Stev.)

Bulbus e basi lata subtruncata conico-ovatus valde bulbillifer. Herba glaberrima. Folia sub anthesi jam emarcida scapum æquantia vel paulo superantia, angustissime linearia canaliculata, concoloria i. e. nervo medio albicante nullo. Scapus digitalis apice corymbose pauciflorus. Flores 3—5. Bracteæ e basi lata lanceolato-acuminata pedicellos superantes. *Pedicelli* curvato-patuli vel summi sub flore adscendentes pollicares. *Perigonii phylla* oblonga v. ovato-oblonga *acutiuscula*, dorso læte viridia marginibus membranacea, *pedicellos* nunc superantia, nunc paulo tantum breviora.

Hab. in Hungariæ comitatus Bihar campis v. pascuis sterilibus domos oppidi Székelyhid partis montanæ meridiem versus adjacentibus, ubi medio Maji floret.

Ornithogalum prætextum Steven in Kunth Enumeratio IV. pag. 363-4 prima fronte jam pedicellis longis alienum.

4. *Allium marginatum Janka.*

Spathæ flores multo superantes. *Perigonium campanulatum*: *phylla* a medio usque ad apicem fusco-purpureo-marginata, etiam carina tota ejusdem coloris, caeterum *perigonum albidum*. Filamenta *perigonium* nequam excedentia, solum antherarum una vel altera effœta e phyllo paulo prominula.

Hab. in herbidis præruptis elatioribus per Transsilvaniam campestrem (Mezőség) e. g. prope pag. Sz.-Gothárd.

Allio pallenti L. proximum sed *perigonii* coloratura et foliis appannatis sat diversum.

5. *Orobanche sambucina Janka.*

Tota candida. — Stigma declinatum flavum demum fuscescens, subbicoccum. Sepala indivisa integerrima, 1-nervia bractea corollam æquante duplo breviora. Corolla candida dorso geniculato-curvata. Labii inferioris laciniæ æquilongae. Filamenta ad (infra) insertionem — in corollæ parte inferiore (supra basin) — pilis aliquot glanduliferis vestita cæterum glaberrima. Antheræ loculilongiuscule mucronati.

Hab. in Sambuco Ebulo ad viam inter prædium Kalján-tó et pagum Kalján Transsilvaniæ centralis, ubi insignem hanc plantam d. 9. Julii 1881 unico loco sat frequentem detexi.