

## Közép-Európa bogarai.

Néhány nap előtt jelent meg *Ganglbauer* „*Die Käfer von Mitteleuropa*“<sup>1)</sup> című classikus műve III. kötetének első fele. Ebben a *Staphylinoidea* családsorozat folytatásaként következő családok vannak feldolgozva: *Scydmaenidae*, *Silphidae*, *Clambidae*, *Leptinidae*, *Platyphyllidae*, *Corylophidae*, *Sphaeriidae*, *Trichopterygidae*, *Hygroscaphidae*, *Scaphidiidae*, *Hysteridae*. A kötet elején megtaláljuk a Staphylinoideák családjainak meghatározó táblázatát is, melyet szerző művének II. kötetébe még nem vehetett fel. Minden egyes családnál, úgy mint eddig is, megtaláljuk a fontosabb irodalom felsorolását, történeti áttekintést, a család jellemzését, felosztását és az egyes testrészek pontos leírását. A jó ábrák (e kötetben 30) a kezdőt a családok morphológiájával hamar megismertetik; a tribus-ok, nemek, fajok meghatározására pedig a kitűnően összeállított és rövid dichotomikus táblázatok szolgálnak. Az anyag feldolgozása pontos és lelkiismeretes, mint az első két kötetben, úgy hogy szerző ezen kötettel is kérdemeite szak társai teljes elismerését és köszönetét. Hazánk a közép-európai faunaterületbe esvén, faunánk e műbe teljesen fel van véve és nem egy fajnál látunk magyar termőhelyeket felemlítve, sőt faunánkra nézve több új adatot is találunk benne. Újak hazánk faunájára a következők:

*Scydmaenidae*: *Cepheninum hannaticum* Ganglb. (n. sp.) a bánáságból és az erdélyi havasokból; *Neuraphus rubicundus* Schm. Horvátországból és Erdélyből; *N. coronatus* J. Sahlbg. a délkeleti felföldről; *N. bulgaricus* Reitt., déli Magyarországból; *Euconus chrysocomus* Sauley hazánkból közelebbi termőhely nélkül és *E. Sturanyi* Ganglb. (n. sp.) a plitvicei tavak környékéről.

*Silphidae*: *Astogobius* (Reitt.)<sup>2)</sup> *angustatus* F.-t Apfelbeck gyűjtötte a horvátországi barlangokban; *Spelacodromus* (Reitt.) *Pluto* Reitt. a Velebit északi lejtőjének több barlangjában; *Choleva uivalis* Kr. a Királykőről; *Nargus Nikitanus* Reitt. Horvátországból; *Catops (Sciodrepa) Watsoni* Spence var. *amoenus* Reitt. a Velebit hegységéből; *Liodes lucens* Fairm. és *Agaricophagus Reitteri* Ganglb. (n. sp.) hazánkból közelebbi termőhely nélkül; *Agathidium Brisouti* Reitt. Dél-Magyarországból.

*Corylophidae*: *Peltinus* (Muls. et Rey) *alutaceus* Reitt, a Fertőtó mellékéről.

<sup>1)</sup> (Wien, 1889. Ára 7 frt.).

<sup>2)</sup> Az elül \* (csillaggal) jelölt nemek faunánkra újak.

*Trichopterygidae*: *Microptilium* (Matthews) *pulchellum* Allib. A Fertő környékéről: *Trichopteryx suffocata* Halid. északi Magyarországból.

*Histeridae*: *Acritus minutus* var. *tataricus* Reitt. Magyarországból (conf. Fauvel Rev. d' Ent. Caen, 1886. 212).

Nem hagyhatom még megemlitetlenül, hogy *Cephenidium delicatulum* Reitt. azonos *C. carpathicum* Reitt.-rel. A *Leptomastax mehadiensis* Friv.-t Ganglbauer újból elválasztja a *L. hypogaeus* Pirazz.-tól, melylyel régebben synonymizálták. *Bathyscia Páveli* Friv. számára új subgenust állít fel *Friwaldszkya* Ganglb. névvel. *Loricaster Viertlii* Reitt. azonos *L. testaceus* Muls. et Rey-vel. A 389. lapon pedig közli a *Saprinus curtus* Rosenh. eredeti leírását 1847-ből azt jegyezvén meg, hogy a leírás alapján *S. puncticollis* Küst.-től különbözik, tehát nem tekinthető avval azonosnak: e bogarat Rosenhauer Magyarországból írta le.

Csiki Ernő.

## Néhány színeltérő lepkéről.

Néhány színeltéréssel bírt lepkéről óhajtok e helyen megemlékezni, a melyek ügyetlenségem miatt nem jutottak birtokomba.

Mult 1897. év július hó 18-án a Nagy-Baár községhez tartozó Valea Corbuluiban (hollók völgyében) lepkésztván, az égerbokrok között *Apatura iris* L. után jártam, miközben előttem, a földről egy lepke fölröpült, a melyet röpülés közben nem tudtam felismerni, ezért követtem és így közelebb érve hozzá, egy *Argynnis latoniá* ismertem fel benne, melynek a szárnya felszíne teljesen fekete volt. A normális színű állatnál látható fekete rajzok itt mint a bársony a selyemből kifénylettek. A szárnyak színe alul is eltért, amennyiben a sárgás-barna és fekete rajzok sötét fekete színt mutattak, melyből a szabályos színű gyöngyház-foltok erősen kiríttak. Mintegy két perczig néztem, bámultam e szép állatot, a mint sütkérezett a napon (a helyett, hogy előbb megfogtam volna s csak azután gyönyörködtem volna benne), mikor a hálómmal utána nyultam, izgalmamban roszul czéloztam s így az állat szépen faképnél hagyott és a víz másik partján álló éger-bokorra repült. Ide is követtem; térdem felül érő, sebes folyású erdei patak vizében közeledtem feléje, már biztosra vettem, hogy hálómba kerül, midőn a hálót reá csaptam, a lábam alatt levő nagyobb kavicsról eesúsztam: a *latonia* elszállt és én — a vízben lubiczkoztam.

Majdnem ugyanígy jártam mult év őszén. Szeptember hó 12-én