

Újabb adatok Magyarország Coleoptera-faunájához.

Irta Csiki Ernő.

A „Rovartani Lapok“ V. és VI. kötetében¹⁾ az 1899. év végéig hazánk faunajából kimutatott és a „Fauna Regni Hungariae“ Coleoptera-füzetében még fel nem sorolt fajok és fajváltozatok jegyzékét közöttem. E két közlemény kiegészítéseül ez alkalommal az 1901. szeptember-hó végéig, részben irodalmilag közzétett, részben újabban gyűjtött és felfedezett állatok jegyzékét adom.

*

Cicindela campestris L. ab. *protos* D. Torre — V. Szucságh (Állattani Közlemények, 1900. 47. 1); *C. silvicola* Latr., *Dej. ab. tristis* D. Torre (*bicolor* Schulz.) — III Tátra (U. o. 42. 1); *C. hybrida* L. subsp. *riparia* Dej.²⁾ — V. Retyezát hegység (U. o. 45. 1); *subsp. maritima* Dej. — VII. Udbina (Ú. o. 46. 1); *C. litoralis* Fabr. ab. *mediterranea* Beuth. — VI. Ulma és ab. *venatoria* Pola. — V. Torda (U. o. 52. 1); *C. germanica* L. ab. *coerulea* Herbst. — VII. Lika Krbava m. (U. o. 48. 1).

Carabus Ulrichi Germ. var. *papukensis* Koča — VII. Papuk hegység és var. *Stüssineri* Haury — VII. Jankovac (Glasnik hrvatsk. narovosl. društva. Zagreb XII. 1900. 101. 1); *C. obsoletus* Sturm var. *Csikii* Maltász — V. Detonáta (Állattani Közlemény. 1900. 88. és 92. 1); *C. comptus* Dej. var. *Dieneri* Merkl — VI. Szörény vm. havasok. (Rov. Lap. VII. 1900. 85.), var. *marginatus* Kr. és var. *Zoppai* Kr. — V. Marosvásárhely (Deutsche Entom. Zeitschr. 1900. 381.).

Dyschirius gibbifrons Apflb. — Ezen balkáni fajt Kuthy Dezső Vinkovce mellett gyűjtötte.

Bembidium Stephensi Crotch. — IV. Marmaros, V. Csáki-Gorbó (a Temeu patak partján a beszterczei hegyekben), VI. Rumunyest.

Trechus constrictus Schm. — VII. Jankovac (Glasnik Zagreb, XII. 1900. 102.); (*Anopthalmus*) *Bielzi* Seidl. var. *pilosellus* Mill.

1) Adatok a magyar Coleoptera-faunához. (Rovartani Lapok. V. 1898. 99—102 és 115—118.) és Pótlék a magyar bogárkatalógushoz. (U. o. VI. 1899. 208—212. 1.)

2) A magyar bogárkatalógusban közölt var. *riparia* Latr. evvel nem azonos, az == ab *monasteriensis* Westhoff.

-- A IV. Mármárosmegyei és V. Rodnai havasokon és a rozsnyói Flintsch barlangban (Brassó vm.) él; Tr. (A.) *Budae Kend. v. cavifuga Ganglb.* — V. Paring és var. *malomvicensis Ganglb.* — V. Malomvíz (Hunyad vm.) (Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1899. 527.)

Platynus viridicupreus Goeze var. dalmatinus Dej. — VII. Papuk hegység (Glasnik Zagreb, XII. 1900. 103. 1.)

Harpalus litigiosus Dej. — VII. Papuk hegység (Glasnik Zagreb, XII. 1900. 104. 1.); *H. taciturnus Dej.* — V. Erdély (Verh. naturf. Ver. Brünn. XXVIII. 1900. 120.)

Acupalpus elegans Dej. var. inornatus Reitt. — II. Fertő. (Verh. naturf. Ver. Brünn, XXXVIII. 1900. 134.)

Haliphus guttatus Aubé — III. Pozsony, (Wiener Entom. Zeitg. XIX. 1900. 23.)

Philydrus hamifer Ganglb. — II. Fertőtő (Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1901. 33.).

Acanthoberosus (Kuw.) *bispinus* Reiche. — I. Budapest. (1898. tavaszán gyűjtötte Wachsmann Ferencz). A genus is új a faunánkra.

Helophorus brevitarsis Kunw. (*glacialis* var. *Deubeli Kraus*) — V. Rodnai havasok (Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 1901. 313) és *H. Zoppae Ganglb.* — V. Mezőség (U. o. 1901. 319.)

Ochthebius Peisonis Ganglb. — II. Fertőtő (U. o. 1901. 320). és *O. viridis* Peyron. — Hungaria (U. o. 1901. 311.)

Eurymniusa (Ganglb.) *plitvicensis Bernh.* — VII. Plitvcai hegység. (Verb. zool.-bot. Ges. 1900. 39). Az *Eurymniusa* nem faunánkra új.

Oxyopoda Spaethi Bernh. — II. Fertő. (U. o. 1900. 532.)

Aleochara bipunctata Oliv. var. *croatica* Penecke — VII. Perusič (Wiener Entom. Zeitg. XX. 1901. 12.)

Leptusa secreta Bernh. — Hungaria (Verh. zool.-bot. Ges. 1900. 403); *L. puellaris* Hmpe var. *sudetica* Lockay — IV. Kárpátok, V. Erdélyi havasok (U. o. 408.)

Tachyporus corpulentus J. Sahlb. és *scutellaris* Rye — Hungaria és *T. formosus* Matth. var. *decoratus* Luze — IV. Nagy-Mihály (Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1901. 155, 170 és 174.)

Mycetoporus oreophilus Bernh. — V. Rodnai havasok. (U. o. 1900. 45.)

Quedius ochropterus Er var. *obscurepennis* Bernh. — V. Negoi. (U. o. 1900. 538.)

Ocypterus brachypterus Kr. var. *aureotomentosus* Bernh. — VII. Fuzine (U. o. 1900. 46.)

Stenus (Nestus) phyllobates Pen. — V. Rodnai havasok. (Wiener Entom. Zeitg. XX. 1901. 14.); *St. transsilvanicus* Bernh. — V. Bucsecs, Rodnai havasok (Verh. zool.-bot. Ges-Wien. 1900. 48.)

Niphetodes Spaethi Ganglb. — IV. Cserna hora, Rodnai havasok, Negoi. (U. o. 1900. 259.)

Omalium funebre Fauvel — V. Rodnai hav. (U. o. 1900. 50.)

Bythinus sculpticollis Reitt. — VI. Herkulesfürdő (gyűjtötte Wachsmann Ferencz.)

Cephalium fulvum Schaum — VII. Croatia sept. (Wiener Entom. Zeitg. XIX. 1900. 240.)

Neuraphus (Pararaphes) Deubeli Ganglb. — V. Negoi (Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1900. 260.)

Thanatophilus mutilatus Lap. — VI. Délmagyarország (Ganglbauer, Die Käfer von Mitteleuropa III. 1899. 175.)

Triplax fusciventris Reitt. (? var. *swanetica* Reitt.) — VII. Virovice (Wiener Entom. Zeitg. XX. 1901. 23—76.)

Lycoperdina succincta L. var. *fasciata* Fabr. — Hungaria (Csiki, Catalogus Endomychidarum, 1901. 29.), var. *disca* Geist. — I. Debreczen, III. Zólyom, V. Nagyszében (Rovart. Lap. VII. 1900. 149.)

Mycetina cruciata Schall. var. *Fussi* Csiki — V. Feleki hegység (U. o. VII. 1900. 150.)

Sphaerosoma (Alexia) *Seidlitzii* Reitt. — VII. Velebit (U. o. VII. 1900. 147.)

Coluocera (Motsch.) *formicarii* Motsch. — VI. Dél-Magyarország. Ezen érdekes fajt, melynek neme eddig hazánkból nem volt ismeretes, Merkl Ede hangya-fészekből rostálta.

Pityophagus laevior Ab. var. *Deubeli* Ganglb. — V. Erdély (Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 1899. 532.)

Cytillus sericeus Forst. var. *tesselatus* Reitt. — VII. Papuk hegység (Koča, Glasnik Zagreb, XII. 1900. 108.)

Simplocaria *Deubeli* Ganglb. — V. Bucsecs (Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 1899. 534.)

Saprinus foecisterinus Schmidt — III. Pozsony (Wiener Entom. Zeitg. XIX. 1900. 23.)

Abraeodes (Reitt.) *Raddei* Reitt. — V. Marosvásárhely : Várhegy (U. o. XX. 1001. 16.) Az *Abraeodes* nem faunánkra új; ez a faj eddig csak a Kaukázusban találtatott.

Abraeus Zoppae Pen. — V. Marosvásárhely: Várhegy (U. o. XX. 1901. 16.)

Sisiphus Boschniaki Fisch. — VII. Lukovo-Sugarje. (Coll. Wachsmann.)

Copris hispanus Linn. — VIII. Zengg. (Coll. Wachsmann.)

Aphodius montanus Erichs. — V. Keresztenyhavas (Wiener Ent. Zeitg. XIX. 1900. 241.)

Anisoplia monticola Erichs. VIII. Novi (1900. július havában gyűjtötte Wachsmann Ferencz.)

Poecilonota festiva L. — VII. Papuk hegység (Koča, Glasnik Zagreb, XII. 1900. 109.)

Phaenops Knoteki Reitt. — VII. Horvátország (Wiener Entom. Zeitg. XIX. 1900. 168.)

Xylobius alui Bouv. — I. Budapest, III. Budatin, VI. Orsova, Herkulesfürdő. (Rov. Lap. VIII. 1901. 102.)

Elatier forticornis Schwarz. — VI. Dél-Magyarország (Deutsch. Entom. Zeitschr. 1900. 99.)

Clerus rufipes Brahm. var. austriacus Reitt. IV. Zsihovecz (Rov. Lap. VII. 1900. 122.)

Trichodes apiarius L. var. unifasciatus Klug. — V. Szász-Sebes (U. o. VII. 1900. 123.)

Enoplium (Latr.) serraticorne Vill. — Hungaria. (U. o. VII. 1900. 123.) Faunánkra új nem.

Necrobia rufipes De Geer var. aeneipennis Csiki. — VI. Grebenácz. (U. o. VII. 1900. 124); *N. pilifera Reitt.* — I. Budapest, V. Szász-Sebes, VI. Oravicza, Herkulesfürdő, Rumunyest. (U. o.)

Laricobius (Rosh.) Erichsoni Rosh. — III. Tátraszéplak. Ezen faj eddig csak az Alpokból volt ismeretes, a Tátrában Wachsmann Ferencz fedezte fel 1901. július havában. A nem is új a faunánkra.

Hedobia pubescens F. var. nigrina Reitt. — VI. Herkulesfürdő (Schilsky, Die Käfer Europas. 36. 5.)

Lasioderma thoracicum Mor. — II. Pécs, (U. o. 36. 20.)

Theca (Muls.) pilula Aubé. — Hungaria (U. o. 36. 50.) A genus faunánkra szintén új.

Dorcatoma setosella Muls. — II. Bakony (U. o. 36. 62.)

Lyctus impressus Com. var. capitalis Schauf. — II. Pécs (U. o. 36. 70 a).

Cis bidentulus Rosh., *C. laminatus Mellié* és *C. punctifer Mellié*. fajokat Schilsky (U. o. 27., 78., 79. és 82) említi Magyarországból közelebbi termőhely nélkül.

Gonodera Luperus Hbst. var. *castanea* Marsh. — I. Bia-Torbág. (Rov. Lap. VIII. 1901. 56.)

Isomira testacea Seidl. — Hungaria (U. o. VIII. 1901. 57.)

Mycetochara pygmaea Redt. — VII. Horvát- és Szlavonország (Rov. Lap. VIII. 1901. 58.)

Cteniopus flavus Scop. var. *murinus* Hbst. — Hungaria (U. o. VIII. 1901. 58.)

Omophlus Proteus Kirsch — Budapest, Ács, Fóth, Alpár Mezőkovácsháza, Szeged, Pilis-Maróth. (U. o. VIII. 1901. 59.)

Emenadia flabellata F. — VIII. Novi (gyűjtötte Wachsmann Ferencz.)

Ptochus (Argoptochus) Strobli Reitt. — V. Keresztény-havas (Deutsche Entom. Zeitschr. 1899. 278.)

Cleonus alternans Hbst. var. *caesus* Gyllh. — Papuk hegység (Koča, Glasnik. Zagreb. XII. 1900. 115.)

Liooma carpathicum Brancsik és var. *ruficollis* Brancsik. — III. Kis-Kriván, Vág-Héve (Rov. Lap. VI. 1899. 194.)

Hypera rubi Krauss — V. Fogarasi- és Kerczi havasok, Negoi (Wien. Ent. Zeitg. XIX. 1900. 189.); *H. comata* Boh. var. *borealis* Krauss — V. Kerczi hegység (U. o. XIX. 1900. 195.)

Coeloides (Cidnorrhinus) Kaufmanni Reitter. — II. Pécs (Coll. Wachsmann), Szabolcs (Wiener Ent. Zeitg. 1901. 86.)

Ceuthorrhynchus striatellus Schultze. — Hungaria (Deutsche Entom. Zeitschr. 1900. 36.)

Baris Gudenusi Schultze. — II. Fertő. (Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1901. 213.)

Cionus ungulatus Germ. — VII. Lič (Coll. Wachsmann.)

Tragosoma (Serv.) *depsarium* Linn. — Faunánkra ez új faj és nem első párja Wachsmann Ferencz szivességéből került a M. Nemzeti Muzeum birtokába, ezek Delnice-ról valók, továbbá Bogsch tanár Jassenak-on, Padewieth pedig a következő helyeken gyűjtötte: Velebit (Stirovača), Trnovac-Jadovno, Ostarija-Crni dabar, Konjsko-Rameno-korito.

Pachyta quadrimaculata L. var. *bimaculata* Schh. — V. Gyulafalva (Wachsmann.)

Leptidea brevipennis Muls. — I. Budapest (Hajóss József gyűjtése.) III Trencsén (Rov. Lapok. VI. 175.)

Rosalia alpina L. var. *prolongata* Reitt. — V. Erdély; var. *geminata* Reitt. — III. Nyitra; var. *parvonotata* Reitt. III. Nyitra; var. *obliterata* Pic. — Hungaria; var. *Pici Csiki*. — Hungaria; var. *Reitteri Csiki*. — VII. Velebit; var. *multimaculata* Pic.

— III. Mátra; var. *confluens* Csiki — Hungaria és var. *transylvanica* Csiki. — V. Kerczi hegység (lásd: Rov. Lap. VII. 1900. 100—102 I. 10 ábrával.)

Zeugophora flavicollis Marsh. var. *australis* Weise — IV. Szomotor, Bárta, V. Cibin-hegység: Dus.(Rov. Lap. VII. 1900. 182. lap.)

Lemna septentrionalis Wse. — I. Debreczen, Pécs, IV. Ungv., V. Brassó, Lotrion-völgye, VI. Rumunyest; L. *Erichsoni* Suffr. var. *Lipperti* Gredl. — V. Magura. (U. o. VII. 1900. 182. I.)

Crioceris quinquepunctata Scop. var. *thoracica* Wse. — V. Dicső-Szent-Márton. (U. o. VIII. 1900. 182. I.)

Cryptoccephalus transcaucasicus Jacobs. — III. Hradec (Archiv f. Naturg. 1900. I. 279.)

Adoxus obscurus L. var. *epilobii* Wse. — Szent-Endre, Turcsék, Vihorlat, Parád, Koritnyicza, Szent-Erzsébet (Szeben m.) és Ferenczfalva; *A villosulus* Schrnk. var. *Weisei* Heyd. — III. Tátra (I. Rov. Lap. VII. 1900. 205. I.)

Orina alpestris Schum. var. *anthrisci* Wse., var. *Bodemeyeri* Wse és *O. virgulata* Germ. var. *orientalis* Wse. — Kereszteny-havas (Arch. f. Naturg. 1900. I. 203. I.)

Phytodecta viminalis L. var. *reniplagiata* Pen. — III. Tátra-Széplak (gyűjtötte Wachsmann Ferencz.)

Phaedon (Sternoplatus) *Deubeli* Weise. — V. Bucsecs (Arch. f. Naturg. 1900. I. 285.)

Sermyle halensis L. — VII. Papuk-hegység (Koča, Glasnik Zagreb, XII. 1900. 120. I.) A faunára új genus is.

Psylliodes Schwarzi Wse (var. a). — Ünökő (Arch. f. Naturg. 1900. I. 293.)

Subcoccinella 24-punctata L. var. *haemorrhoidalis* F. — I. Budapest (Wachsmann Ferencz.)

Adonia variegata Goere var. *transylvanica* Pen. — V. Mező-Záh. (Wiener Entom. Zeitg. XX. 1901. 20.)

Adalia bothnica Payk. var. *destituta* Wse. — III. Tátra-széplak (Wachsmann.)

Anatis ocellata L. var. *Boeberi* Cederjh. — I. Budapest, V. Déva (Mallász.)

Halyzia 18-punctata var. *Andersoni* Woll. — VIII. Cirkvenica (Wiener Entom. Zeitg. XX. 1901. 21.)