

Eperjes kornyékének araszló pilléi.

Irta Dahlström Gyula.

II.

Mesotype virgata Hufn. r. IV. 26—V. 30 és VII. 4—VIII. 10.

Minoa murinata Sc. k. V. 5—VI. 10 és VII. 20—IX. 8.

Odezia atrata L. r. V. 26—VI. 20 és VII. 20—VIII. 10;

tibiale Esp. i. r. (Husz).

Lithostege griseata Schiff. gy. V. 6—10; *farinata* Hufn. gy. VI. 6—VII. 10.

Anaitis praeformata Hb. gy. VI. 26—VII. 20; *plagiata* L. gy. I. iv. V. 6—V. 31; var. *pallidata* Stgr. r. II. iv. VII. 15—VIII. 8; *paludata* Thnb. var. *imbutata* Hb. r. (Husz).

Chesias spartiata Fuessl. r. VI. 24—V. 30 és IX. 10—X. 20; *rufata* F. gy. IV. 16—V. 26 és IX. 2—X. 10.

Lobophora polycommata Hb. gy. IV. 20—V. 26; *sertata* Hb. r. IV. 15—V. 26; *carpinata* Bkh. gy. IV. 8—V. 20; *halterata* Hufn. k. és ab. *zonata* Thnb. gy. IV. 6—V. 18; *sexalisata* Hb. r. IV. 10—V. 24; *appensata* Ev. r. IV. 20—V. 30; *virata* Hb. r. IV. 15—V. 25.

Chematobia brunata L. k. X. 4—XI. 10; *boreata* Hb. gy. X. 1—XI. 4.

Triphosa dubitata L. gy. IV. 24—V. 20 és VII. 20—VIII. 30; ab. *cinereata* Steph. r. II. iv. VIII. 2—VIII. 30.

Eucosmia certata Hb. gy. IV. 26—V. 30; *undulata* L. k. V. 1—V. 31.

Scotosia vetulata Schiff. gy. VI. 12—VII. 24; *rhamnata* Schiff. gy. VI. 12—VII. 25; *hadiata* Hb. r. IV. 1—V. 6.

Lygris reticulata F. i. r. VI. 26—VII. 16; *prunata* L. k. VII. 14—VIII. 25; *testata* L. i. r. VII. 24—VIII. 30; *populata* L. gy. és ab. *musuaria* Frr. i. r. VII. 20—VIII. 22; *associata* Bkh. r. VII. 2—VII. 31.

Cidaria dotata L. gy. VI. 22—VII. 26; *fulvata* Forst. r. VII. 15—VIII. 20; *ocellata* L. k. VII. 14—VIII. 25; *bicolorata* Hufn. r. VII. 16—VIII. 26; *variata* Schiff. gy., v. *obeliscata* Hb. r. és ab. *stragulata* Hb. V. 2—VII. 30; *juniperata* L. gy. IX. 15—X. 20; *siterata* Hfn. gy. és *mita* L. gy. V. 10—VI. 8 és VIII. 20—X. 31; *truncata* Hufn. r., ab. *perfusata* Hw. r. és ab. *latefasciata* i. r. VI. 6—VI. 30 és VIII. 2—VIII. 31; *firmita* Hb. i. r. V. 20—VI. 24 és VIII. 24—IX. 26; *olivata* Bkh. gy. VII. 20—VIII. 28; *viridaria* F. gy. VI. 12—VII. 20; *salicata* Hb. r. és var. *ruficinctaria* Gn. i. r. V. 20—VI. 24; *didymata* L. i. r. VI. 10—VII. 25; *vespertaria* Bkh. gy. VII. 16—VIII. 30; *incursata* Hb. r. (Husz), *fluctuata* L. k. V. 2—VI. 5 és VII. 28—VIII. 30; *montanata* Bkh. gy. és var.

fuscumarginata Stgr. V. 25—VII. 10, *quadrifasciaria* Cl. gy. V. 12—VI. 15 és VII. 15—VIII. 26, *ferrugata* Cl. k., ab. *spadicaria* Bkh. r., ab. *obscura* Distr. i. r. és v. *unidentaria* Hw. r. (I. iv.) V. 15—VI. VI. 24 és VII. 24—VIII. 29, *suffumata* Hb. gy. IV. 28—VI. 8, *pomoeraria* Ev. gy. IV. 25—V. 28 és VII. 15—VIII. 18, *designata* Ross. gy. V. 15—VI. 28, *fluvialata* Hb. r. (Husz), *vittata* Bkh. r. (Husz), *dilutata* Bkh. k., ab. *obscurata* Frr. gy. és var. *autumnata* Gn. r. IX 16—X 30, *caesiata* Lang. gy. és var. *annosata* Zett. r. VII. 18—VIII. 30, *nebulata* Tr. r. V. 12—VI. 20, *tophaceata* Hb. r. V. 25—VII. 30, *frustata* Tr. r. (Husz), *verberata* Sc. r. VII. 2—VII. 31, *scripturata* Hb. r. VII. 1—VIII. 4, *riguata* Hb. r. (Husz), *picata* Hb. r. VI. 4—VII. 6, *cnuculata* Hfn. r. V. 20—VI. 30, *galiata* Hb. gy. V. 15—VI. 20 és VIII. 8—IX. 6, *rivata* Hb. gy. V. 15—VI. 20 és VIII. 12—IX. 10, *sociata* Bkh. k. V. 13—VII. 20, *unangulata* Hw. r. V. 26—VI. 30, *alaudaria* Frr. gy. V. 10—VI. 18, *albicillata* L. gy. V. 15—VI. 24, *lugubrata* Hb. k., és v. *obductata* Möschl. V. 10—VI. 8. és VII. 15—VIII. 20, *hastata* L. gy. var. *golicata* Gn. r. és var. *subhastata* Nick. r. V. 18—VI. 8. és VII. 15—VIII. 20, *tristata* L. k. IV. 20—VI. 24. és VII. 18—VIII. 20, *luctuata* Hb. gy. V. 15—VI. 26 és VIII. 10—IX. 15, *moluginata* Hb. gy. V. 12—VI. 16 és VIII. 4—IX. 26, *affinitata* Steph. i. r. és var. *turbaria* Steph. i. r. VI. 14—VII. 12, *alchemillata* L. gy. V. 26—VI. 30, *ingunnaria* H.-S. i. r. VII. 2—VII. 31, *hydrata* Tr. i. r. (Husz), *unifasciata* Hw. r. és ab. *aquilaria* H.-S. r. VI. 16—VII. 24, *minorata* Tr. r. VII. 1—VII. 31, *adaequata* Bkh. gy. VI. 14—VII. 18, *albulita* Schiff. k. V. 18—VI. 20, *andidata* Schiff. k. V. 24—VII. 16, *iestaceata* Don. gy. V. 24—VII. 6, *Blomeri* Curt. i. r. VII. 2—VIII. 4, *decolorata* Hb. r. VI. 5—VII. 10, *luteata* Schiff. gy. V. 20—VI. 25, *obliterata* Hfn. k. VI. 10—VII. 28, *bilineata* L. k. VI. 25—VIII. 20, *sordidata* F. gy., var. *fusco-undata* Don. gy. és var. *infusata* Stdgr. r. VI. 19—VII. 26, *trifasciata* Bkh. gy. V. 15—VIII. 4, *capitata* H.-S. r. IV. 25—V. 30. és VII. 20—VIII. 24, *silaceata* Hb. gy. és ab. *insulata* Hw. (Husz) mint az előbbeni; *corylata* Thnb. gy. V. 15—VI. 22, *berberata* Schiff. r. V. 10—VI. 15. és VII. 25—VIII. 20, *nigrofasciaria* Goetze. r. IV. 15—V. 26, *rubitata* F. gy. és var. *fumata* Ev. r. V. 12—VI. 26, *sagittata* F. i. r. VII. 20—VIII. 26, *comitata* L. k. VII. 18—VIII. 20, *lapidata* Hb. i. r. IX. 10—X. 20, *polygrammata* Bkh. r. és var. *conjunctaria* Ld. r. VIII. 25—IX. 20, *aquata* Hb. i. r. VI. 4—VII. 10, *vitalbata* Hb. i. r. VI. 10—VII. 20, *tersata* Hb. r. I. iv. V. 24—VI. 30, v. *tersulata* Stdgr. r. II. iv. VIII. 4—IX. 10, *aemulata* Hb. gy. V. 20—VI. 25.

Colix sparsata Tr. r. VI. 12—VII. 20.

Eupithecia oblongata Thnb. r. VI. 8—VII. 16, *insigniala* Hb. r. V. 4—VI. 6, *subnotata* Hb. gy. VI. 16—VII. 20, *linariata* F. r. VI. 14—VII. 18, *pusillata* F. gy. V. 10—VI. 12, *abietaria* Göze. r. V. 4—VII. 6, *logata* Hb. r. VI. 10—VII. 20, *debilitata* Hb. r. VI. 6—VII. 10, *coronata* Hb. r. V. 6—VI. 15, *rectangulata* L.

k., ab. *subaerata* Hb. k., ab. *cydoniata* Bkh. r. és ab. *nigrosericeata* Hw. r. V. 25—VI. 20. *chlocrata* Mab. i. r. V. 25—VI. 20, *scabiosata* Bkh. gy., ab. *obrutaria* H.-S. r. és ab. *aquistrigata* Sidgr. r. V. 10—VI. 18, *millefoliata* Roesl. i. r. V. 15—VI. 30, *denticulata* Tr. (Husz), *succenturiata* L. gy. V. 17—VI. 28, *nanata* Hb. r. és ab. *obscurata* Stgr. r. V. 10—VI. 6 és VII. 15—VIII. 20, *imnotata* Hufn. k. IV. 12—V. 24. és VII. 20—VIII. 24, *semigrapharia* H.-S. (Husz), *Mayeri* Mn. r. (Husz), *tenniata* Hb. gy. VI. 20—VII. 25. *pumbeolata* Hw. r. VI. 24—VII. 18, *immundata* Z. r. VI. 2—VII. 4, *satyrala* Hb. gy. és ab. *subatrata* Gn. r. V. 6—VI. 2, *varianata* Hb. r. (Husz), *veratraria* H.-S. V. 25—VI. 29, *hebraicaria* B. r. és var. *arcenthala* Frr. r. V. 12—VI. 30, *castigata* Hb. gy. V. 15—VI. 24, *trisinuaria* H.-S. r. V. 12—VI. 22 *selinata* H.-S. r. V. 3—VI. 10, *virgaureata*. Dblid. i. r. VI. 15—VII. 30. *vulgata* Hw. gy. V. 26—VI. 30, *campanulata* H. S. i. r. VI. 6—VII. 16. *albipunctata* Hw. r. V. 15—VI. 18, *actaeata* Wadd. r. V. 15—VI. 20, és VIII. 22—IX. 26. *assimilata* Gn. gy. V. 15—VI. 20. és VIII. 10—IX. 18, *absinthiata* Cl. r. V. 20—VI. 30, *expallidata* Gn. i. r. VI. 15—VII. 30, *pinipinellata* Hb. gy. VII. 4—VIII. 10, *euphrasiata* H.-S. i. r. V. 14—VI. 20, *distinctaria* H.-S. r. VI. 18—VII. 24, *indigata* Hb. i. r. VI. 20—VII. 26, *lariciata* Frr. i. r. V. 4—VI. 6, *silenata* Stdfs. r. V. 6—VI. 10, *abbreviata* Steph. r. IV. 10—V. 12, *exiguata* Hb. i. r. V. 10—VI. 15, *lanceata* Hb. r. IV. 25—V. 20, *sobrinata* Hb. r. VIII. 15—IX. 10, *pumulata* Hb. r. IV. 10—V. 15. és VII. 15—VIII. 20.

Különfélék.

A British Museum lepkegyűjteménye a south-kensingtoni természetrajzi muzeumban, jelentékeny gyarapodást nyert az utóbbi időkben John Henry Leech híres lepkegyűjteményének megszerzése által. Leech gyűjteménye az európai, közep- és kelet-ázsiai lepkeknek majdnem páratlanul gazdag gyűjteményét tartalmazza. A kelet-ázsiai moly-félék gyűjteményét Leech meg elértében eladta a muzeumnak s halála után a muzeum, az elhunyt anyjának bőkezűsége által elősegítve, a gyűjtemény többi, az előbbinél még fontosabb részét is megszerezte. Allitolag a British Museum külön katalógust fog kiadni e gyűjteményről, melynek gazdagságáról egypár adat fogalmat nyújthat. A Rhopalocerak-ból több mint 18 ezer példány van a gyűjteményben, melyek 1100 fajt képviselnek, s ezek közül több mint 400 him- és nőstény fajtypust Leech írt le. A gyűjtemény igen gazdag palaearktikus chinai és japáni fajokban s európai lokális alakokban s azok aberrációiban is. A Heterocerak körülbelül 23 ezer példánnyal vannak a gyűjteményben képviselve, köztük igen szép aberrációk és változó fajok terjedel-