

megjelent füzetének méltó társa. Reméljük, hogy a lepke- és a bogárhatározóról jobbat írhatunk.

Csiki Ernő.

*

Aigner-Abafi, L. v., Zur Lepidopteren-Fauna Rumäniens. (Bullet. de la Soc. des Sciences de Bucarest-Roumanie. IX. 1901. No. 5. p. 1—21. Sep.)

Szerző Dr. Fleck Ede ugyane folyóiratban megjelent „Die Macrolepidopteren Rumäniens“ (Vol. VIII. 1899.) című dolgozatához kiegészítőleg a Rumánia faunájára fontos adatokat összegezte. Fleck ugyanis a rumániai fajoknál megjegyezte azok előfordulását a szomszédos területekben is. A mi a magyarországi adatokat illeti, a Horváth-Pável-féle 1874-ben megjelent „Magyarország nagy-pikkely röpűinek névjegyzékét“ és Viertel-nek egy kéziratát használta; a „Fauna Regni Hungariae“ lepidopterai részét nem ismerte. Érdekes a Rumániára fontos összeállított adatokon kívül, azon lepkék jegyzéke is, a melyek Rumániában előfordulnak, de hazánkban még nem találtattak, pedig elterjedésüket tekintve, valószínűleg nálunk is meglesznek találhatóak; ezeknek egy része délkeleti, másik része pedig nyugati faj. Északi állatok közül csak négy olyan fordul elő Rumániában, a mely Magyarországön még nem találtattott.

Csiki Ernő.

*

Schött, Dr. H., Apterogota von Neu-Guinea und den Sunda-Inseln: Termr. Füz. XXIV. 1901. p. 317—321.
Leírása a Biró Lajos által Új-Guineában és Aurivillius K. által a Sunda-szigeteken gyűjtött fajoknak, köztük Új-Guineából 7 új faj.

A. L.

*

Daday, Dr. E., Diagnoses praecursoriae Copepodorum novorum e Patagonia: Termr. Füz. XXIV. 1901. p. 345—350.

Előleges rövid leírása 8 patagomiai új Copepoda-fajnak, köztük *Boeckella Entzii*.

A. L.

*

Szépligeti Gy., Tropische Cenocoelioniden und Bracniden aus der Sammlung des ung. National-Museums: Termr. Füz. XXIV. 1901. p. 353—402.

Számos tropikus új fajnak leírása, leginkább Braziliából, de Új-Guineából is, Biró Lajos gyűjtéséből, köztük: *Megalommum Birói*, *Iphiaulax Birói* és *Leptobracon Mocsáryi*.

A. L.