

de a melyek a hátoldal felé hajlítottak, úgy hogy a felsőszárnyat az alsó szárny elfödi s az elülső szegély a hát középvonala felé irányzott. Tavaszkor csaknem csupán tücsköt, csótánt, fülbemászókat és néhány Tettix-fajt találni; júniusban jelentkeznek az első Phaneropteridák és Tryxalidák, de csak júliusban lép fel az Orthopterák főtömege, mely azután az őszi végéig fokozatosan eltűnik. Egyesek, kivált a domestikált fajok egész éven át találhatók minden stádiumban. Orthopterák csaknem mindenütt fordulnak elő, mind nedves réteken és mocsarakban, mind szántóföldeken és havasi réteken, erdőszélen, irtásokban és száraz dombokon. Némelyike emberi lakokban, raktárakban stb. él, mások fű közt vagy lomb alatt, különféle fákon, bokrokon és növényeken, kivált csalánon, páfrányon, szederen, mogyoró- és tölgybokrokon, hárs- és bükkfákon, valamint fenyőkön. Egy részük lyukakban, kövek és száraz tehénganélj alatt lakik, mások sziklarésekből s a földi hangya fészkeiben; a sűrű erdőt azonban többnyire kerülik.

A rovarok felczédulázására dr. Brunetti egységes czédulák használatát ajánlja, még pedig a következő adatokkal: 1. A termőhely és ország pontos megjelölése; 2. A datum sora: év, hónap, nap; a hónap római számmal jelölendő; 3. A gyűjtő neve oldalt feljegyzendő; 4. A czédula úgy megerősítendő, hogy a rovar jobb oldaláról olvasható legyen. Ime a példa:

Hűvösvölgy Budapest, Hung. 1903. VII. 3.	II 6 V
--	--------

„Magyarország lepkei, tekintettel a szomszédországok faunájára“. Ez lesz címe egy lepkekönyvnek, melynek megírásával megbízta A. Aigner Lajost a Kir. m. Természettudományi Társulat. A munka a Berge-féle német lepkekönyv mintájára készül s annak ábráival lesz ellátva és a társulat könyvkiadó vállalatában alighanem már az 1904-iki karácsonyi piacon fog megjelenni. Ellenben elmarad egyelőre ugyanazon szerző „Magyarország pillangói“ című pályanyertes monographiájának kiadása.