

**A lepkék cselofogására** nézve figyelmeztet egy tapasztalt lepkész, hogy ennél nagy befolyása van a szél irányának és erejének. Szeles idő még nem akadályozza a sikeres fogást, hacsak az erős szélhez nem járul még hűvös idő is: legkedvezőtlenebb különben az északi és északkeleti szél. A holdvilág sem akadály, csak ha egyúttal hűvös, szeles idő van. A legjobb eredmény várható szárazabb meleg nyugati szél mellett és ha zivatar közeleg. Igen fontos a hely választása; legalkalmasabb a csalétekkel való fogásra: erdőszéle, buja növényzetű rétek határán; erdei tisztás vagy vágás, a hol sok a bozót, málna és szeder-bokor; kökény sövény és mocsaras rét. Kevésbé fontos a csaléteknek használt keverék mineműsége; egészen mindegy akár a sörhez mézet, cukrot vagy szörpöt keverünk, de használat előtt okvetlenül szükséges jó adag alma- vagy körte aethert hozzá vegyíteniünk; a lisztnek vagy kenyérmorzsának hozzá vegyítése előmozdítja az erjedést. Elég ha a keveréket 24 óráig hagyjuk erjedni. A fogásnál tapasztalható, hogy sok lepke azonnal elszáll vagy földre ejti magát, mihelyt a lámpás fénye éri; minélfogva czélszerű az erre a czélra használt lámpásba zöld üveget tételnünk: az nem riasztja el a lepkéket.

**A Catocalákról** érdekes megfigyeléseket tett Slevoigt B. kurlandí lepkész. A *Catocala fraxini* s a nem egyéb fajaira nézve megerősíti azt a megfigyelést, hogy ezek a pillék megszelidíthetők. Egy alkalommal számos *Catocala*-nöstényt fogván, néhányát alkalmas házikóban helyezte el lepetezés végett; minthogy ezt azonban olykor 5—7 nap múlva végzik, kénytelen volt őket a csaléteknek szánt keverékkel etetni, s ezt mindig a napnak bizonyos órájában tette. Valahányszor erre a czélra benyitott a szobába, a pillék kezdtek nyugtalanzkodni és mihelyt a házikót kinyitotta, kinyújtották szipókájukat, várva a táplálékot. — *Catocala fraxini*, mely különben nesztelenül szokott röpködni, némelykor sajátságos pattogó hangot ad, de úgy látszik csak akkor, ha más nembeli fajtársával találkozik. — Ha a *Catocala sponsa* hernyóját fájának más példányai nyugtalanítják, testének felső részét erősen lóbálja jobbra-balra, mi által gyöngébb társait elbódítja s azután felfalja. Ennélfogva nem tanácsos, sok hernyót tartani egy házikóban.

**A British Museum lepkei.** Midőn 1899-ben a zoológusok nemzetközi congressusa alkalmával dr. Horváth Géza, a M. Nemzeti Múzeum osztály igazgatója Angolországban járt s a British Museumot is meglátogatta, annak igazgatójához azt a kérdést intézte, vajjon a lepke-gyűjtemény hány példányt foglal magában? Erre nem tudott felelni, mert azt nem tudta senki! meg-

bízásából azonban egyik tisztviselő hozzávetőleg kiszámította a lepkék számát úgy, hogy egy-egy fiókban átlag 56 drb. lévén, a 2580 fiókban összesen mintegy 145.000 drb. van a gyűjteményben. Ezzel a M. Nemzeti Múzeum gyűjteménye természetesen nem vetekedhetik, a mely, beleértve a fölös példányokat is, összesen mintegy 60.000 példányt foglal magában.

---

## Irodalom.

**Reitter Edm.**, Bestimmungs-Tabelle der Coleopteren-Gattung *Cionus* Clairv. aus Europa und den angrenzenden Ländern. (Wiener Entom. Zeitung. XXIII. 1904. p. 47.—64.)

Szerző a paläarktikus *Cionus*-fajok meghatározására kulcsot állított össze, melyben néhány új alak leírását is találjuk. Újak: *C. scrophulariae* v. *ferrugatus* Dalmácia, Kisázsia és Syriából, *hortulanus* v. *auriculus* a Kaukázusból, *C. Schultzei* és var. *Tiefenbachi* Görögország, Törökország és Kisázsziából, *C. thapsi* var. *nigritarsis* Galicziából és az Alpesekéből, v. *semialbellus* Sarepta környékéről, *C. simplex* v. *bipunctatus* Közép-Magyarország, Bulgária, Podolia, Dél-Oroszország, Volga-torkolat és az Örmény hegységből, v. *uniformis* a Kaukázusból, *C. subalpinus* az Alpesekéből, *C. Helleri* Japánból, *C. pulverosus* v. *densnotatus* Erivan mellől, v. *albopubeus* Orosz-Örményországból és *fraxini* v. *obscurus* Németországból. Csiki Ernő.

\*

**Petri, Dr. Karl**, Beschreibung einiger neuer *Lixus*-Arten. (Wiener Entom. Zeitung. XXIII. 1904. p. 65—77.)

18 paläarktikus új *Lixus*-faj leírása, közöttük a *Lixus Apfelbecki*, mely a Fekete tenger mellett Burgas-nál és hazánkban Ujpest-nél fordul elő. Csiki Ernő.

---

**Levélszekrény. Gy. úrnak K.-n.** — Azt nagyon jól tudjuk és azt hiszem nincs bogarász, a ki evvel nem volna tisztában. Az *Amarini*, *Zabrini* és *Harpalini* nemzetségekre tartozó fajok ha nem kizárólag, de főleg növényi anyagokkal táplálkoznak. A cikkek tartalmáért a szerzők felelősek, mi nem változtatunk azokon.