


gyűjtő megszerezhesse. Előjegyzéseket már most is elfogad a szerző (Csiki Ernő, Bpest, VIII. M. Nemz. Múzeum), annál is inkább, hogy a nyomandó példányok szana előre is pontosan megállapítható legyen.

**Ritka hangya építmény.** Nagyenyed vidékén igen gyakoriak a fűzfákba épített hangyafészkek. A *Camponotus lateralis* Oliv. nevű hangyafaj építi őket; egy-egy kidőlt vén fa belsejéből halom számára dől ki a sok fa-törmelék amelyet ágasbogas járataikból kiszórtak. Maguk e járatok milliméternyi s még vékonyabb falak



közt haladnak, úgy hogy a fa-anyagnak csak keves része az, a mi ily választófalak alakjában megmarad, a többit az építők elta-  
volították. A fa pusztulásával rendszeren e laza cső-rendszer is szét-  
omlik s ilyenkor már csak töredékeit találjuk meg. Nemrég Rein-  
bold Olivér pénzügyi tanácsos úrnak sikerült egy ép példány meg-  
mentése, a melyet benedeki kertjében egy vén fűzfa kidöntésekor  
talált s a nagyenyedi Bethlen kollégium gyűjteményének ajándé-  
kozott. Mellékelt képünkön mutatjuk be; magassága 57 cm.

Dr. Szilády Zoltán.

**Tiszavirág Debreczenben.** Somogyi Géza bányamérnök bará-  
om f. é. június 23-án a tiszavirág egy fajának (*Palingenia longi-*

*cauda* Ol.) néhány példányát küldte nekem Debreczenből. Ezek az állatok az nap este oly tömegesen röpködtek ott, hogy az Arany Bika szálloda udvarán bokáig jártak a lehullott példányok közt. A jó debreczeniekben pedig nagy rémületet keltett ez az előttük ismeretlen állat, mert valami sáskának gondolták. Óriási tömegekben száll e faj június közepe táján hazánk nagyobb folyói s így a Tisza fölött is; de hogy ily tömegben a vizektől távol eső Debreczenig is eljusson, az talán mégis feljegyzésre méltó eset.

Dr. Szilády Zoltán.

**Madár mint lepkeevadász.** Riga környékén lakó entomologus kertjében virult június második felében a *Caprifolium* két nagy bokra, melyeket számos *Sphinx ligustri*, *Hyloicus Pimastri* és *Chaerocampa elpenor* keresett fel. Az egész idő alatt alkonyattól 1 $\frac{1}{2}$  óráig a bokrok közelében tartózkodott egy pár töviszúró gébics (*Lanius collurio*), mely ezeket a nagy szendereket rendkívüli ügyességgel elkapta. Három lépésnyire is meglehetett őket közelíteni, anélkül, hogy ez zavaria volna. Nappal sem jöttek a bokrok felé, se a virágzás ideje előtt vagy után; ahelyett a lepke-csalétek közelében jártak-keltek. s arról este a lepkéket, nappal pedig a nagy legyeket szedegették. Ez a tény igen figyelemre méltó, mert a *Lanius* különben nem szokott éjjelezni s ilyenkor vadászni; eszerint ez a sport ennek a madárpárnak véletlenül szerzett tapasztalás útján vált szokásává.

## Irodalom.

**Horváth, Dr. G.** *Species palaearticae generis Caliscelis* Lap. (Ann. Mus. Nat. Hung. II. 1904, p. 378—385.)

A kábóczafélék egyik nemének (*Caliscelis*) a palaearticus regioban előforduló fajoknak monographikus feldolgozása, melyben a hímek és nőstények meghatározására szolgáló kulcsokon kívül, a hét fajra vonatkozó elterjedési adatokat találunk. Három faj ezek közül új (*C. maroccana* Marókkóból, *C. Bolivari* Spanyolországból és *C. peculiaris*). Hazánk területén a *C. Wallengreni* Stal, *C. affinis* Fieb. és *C. Bonellii* Latr. fordul elő. Csiki Ernő.

\*

**Kohaut R.** Egy új bolhafaj Boszniából. — Un Puli-cide nouveau de Bosnie. (Annales Muséi Nationalis Hungarici. II, 1904, p. 87—89. egy ábrával.)