

által, hogy közlés előtt gyűjtésük eredményét a Magyar Nemzeti Múzeumba küldik be, a hol szívesen vállalkoznak annak revíziójára.

A. Aigner János.

*

Bazzi, Dr. Mario, Empididae novae palaearcticae ex Museo Nationali Hungarico. (Annales Musei Nationalis Hungarici. II, 1904. p. 198—202.)

Öt új közép-európai légyfaj leírása, ezek közül kettő faunaterületünkben való: *Rhamphomyia anfractuosa* Győnről (azonkívül Alsó-Ausztria: Mödling és Németország: Berlin) és *Climocera microstigma* Boszniából (Trnovo; gyűjtötte Thalhammer).

Csiki Ernő.

*

Mayr, Dr. Gustav, Hymenopterologische Miscellen. III. (Verh. zool.-bot. Ges. Wien. LIV, 1904, p. 559—598.)

Szerző egyebek között magyarországi fajokkal is foglalkozik e dolgozatában és leírja az *Ormyrus Wachtli* új fajt Fiuméből és Dalmáciából (az *Aulax Salviae* Ger. gubacsából és a *Salvia officinalis* L. elváltozott terméséből) és az *Eurytoma infracta*-t Fiuméből (*Salvia officinalis* L. terméséből). Mindkét új fajt Korlevich tanár, az elsőt azonkívül maga Mayr is gyűjtötte.

Csiki Ernő.

*

Baker, C. F., A Revision of American Siphonaptera, or Fleas, together with a Complete List and Bibliography of the Group. (Proc. U. St. Nat. Mus. XXVII, 1904, p. 365—469. t. 10—26.)

Szerző az amerikai bolhák monographikus feldolgozását nyújtja, melyben azonban tekintettel van az összes eddig leírt családokra és nemekre. Baker a bolhákat öt családra osztja: *Sarcopsyllidae* Taschenberg, *Hectopsyllidae* (új), *Vermipsyllidae* Wagn., *Megapsyllidae* Baker és *Pulicidae* Steph. A családokon belül megtaláljuk az összes nemek meghatározására szolgáló kulcsokat. A fajok leírása elég részletes, a szükséges részletrajzok pedig 16 táblát töltenek meg. A közlemény végén a földkerekségéről 1903 január 1-éig leírt összes bolhafajok systematikus és gazdaállatok szerint való jegyzékét találjuk meg, azonkívül az összes irodalom felsorolását.

Csiki Ernő.