

*Agrion splendens* Harr. (sokféle színváltozatban, különösen a ♂) I. Budapest, Dánospuszta, Mesterszállás, Szeged, Csongrád, Szintye, Kecskemét, Félégyháza; II. Muraszombat, Kőszeg, Bala tonfüred; III. Lipótvár; Putnok; IV. Kassa; V. Maroskesze; VI. Baja, Apatin, Zenta, Nagybecskerek. — *virgo* Linn. II. Muraszombat; III. Lipótvár, Pálfalu (Liptó m.); V. Máramarossziget; V. Szász-régen, Riuser (Fogarasz.).

*Micronympha pumilio* Charp. I. Budapest, Félégyháza, Csongrád; V. Maroskesze. — *elegans* Lind. I. Budapest, Szintye; II. Keszthely; III. Lipótvár; VI. Nagybecskerek, Zenta.

*Enallagma cyathigerum* Charp. I. Budapest.

*Coenagrion pulchellum* Lind. I. Budapest; II. Keszthely; III, Lipótvár. — *puella* Lind. III. Lipótvár; VI. Nagybecskerek. — *ornatum* Selys. II. Keszthely, Muraszombat, III. Lipótvár, VI. Apatin, Nagybecskerek.

*Erythromma najas* Hans. I. Budapest, Félégyháza. — *viridulum* Charp. VI. Nagybecskerek.

*Lestes viridis* Lind. VI. Nagybecskerek. — *sponsa* Hans. I. Budapest, Csongrád, Szintye; II. Muraszombat, Kömlőd (Komárom m.), III. Lipótvár, Leibicz, Putnok; V. Szent Anna tó. VI. Nagybecskerek. — *viridis* Charp. III. Lipótvár; V. Maroskesze, Szent Anna tó; VI. Nagybecskerek. — *barbarus* Fabr. I. Budapest, Csongrád, Mesterszállás, Szeged; II. Muraszombat; V. Maroskesze. VI. Apatin, Nagybecskerek.

*Sympycna fusca* Lind. I. Budapest, Félégyháza; II. Keszthely Muraszombat; V. Maroskesze; VI. Zenta. Baja, Nagybecskerek.

## Magyarország Cerambycidai.

Irta Csiki Ernő.

XVII.

67. nem: **Acanthocinus Steph.**

(*Astynomus* Steph., *Graphisurus* Kirby)

- 1 A hátsó lábfej első íze olyan hosszú mint a többi együttvéve 2.  
— A hátsó lábfej első íze sokkal hosszabb, mint a többi együttvéve. Barna, szürke szőrökkel sűrűn fedett, a szárnyfedők tőve egy harántcsík a közepén és a csúcs szürke szőrös, helyenkint csupasz fekete foltokal. Alul szürke szőrökkel sűrűn fedett

és feketén pontozott. A csápízek szürkék fekete csúcsal, a lábak szürkék, a czomb és lábszár vége fekete. A hím csápjá négyszer, a nőstényé másfélszer oly hosszú mint a test. Hossza 9—11 mm. — Előfordul egész Európában, nálunk elég ritka; termőhelyei: III. Zsolna, IV. Mármaros (Menczul-hegy), V. Medgyes, Gyulafalva, Görvény. (*nebulosus* Scop., *carinulatus* Gebl., *alpinus* Redtb.)

### 3. *griseus* Fabr.

2. A szárnyfedőkön nincsenek bordák vagy legfeljebb azok nyoma látható. Barna, sűrűn szürke szőrözettel borított, a szárnyfedők közepe mögött széles rézsutos sötét harántcsikkal. A hím csápjá ötször, a nőstényé kétszer oly hosszú mint a test; az első csápíz külső oldala és csúcsa fekete. Hossza 13—19 mm. — Előfordul egész Európában, hazánkban a hegyvidék egész területén, fenyvesekben található. Nem ritka. (*montanus* Serv., *aceruus* Voet) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- **1. aedilis** Linn.

- A szárnyfedők mindegyikén négy borda van, a varrat és az oldalszél eléggé kiemelkedő és fekete szőrös foltokkal díszített. Foltokban szürke-szőrös, a szárnyfedők közepe mögött többé-kevésbé egyenes sötét harántcsikkal. Hossza 11—13 mm. — Előfordul Közép-Európában; nálunk elég ritka. Termőhelyei: III. Besztercebánya, IV. Bártfa, V. Gyulafalva. (*atomarius* F., *nebulosus* F.) ---

### 2. *reticulatus* Razum.

#### 68. nem : **Liopus** Serv.

Fekete, sűrűn szürke szőrökkel fedett, a szárnyfedők a tövükön, a közepén és a csúcson sárgás-szürke szőrök, két fekete harántcsikkal és szétszórtan több apró fekete folttal. A szárnyfedők a csúcson egyenként kerekítettek. A csápok feketék, a hátsó lábfej első íze alig oly hosszú, mint a többi íz együttvéve, szürke, a csúcsa fekete. Hossza 6—8 mm. — Előfordul Közép- és Észak-Európában, nálunk közönséges (*ligriiformis* Loet.) **1. nebulosus** Linn.

#### 69. nem : **Hoplosia** Muls.

(*Lepargus* Schiödte.)

Hosszukás, keskeny, szürkeshörös, a szárnyfedők csúcsán és némelykor a közepük előtt csupasz rozsdavörös harántcsikkal. Az előtor harántos, sűrűn pontozott, kétoldalt a közepe mögött hegyes felálló tüskével. A szárnyfedők a csúcson egyenként kerekítettek, elül mély, a közepén

sorokban elhelyezett és hátrafelé gyérülő pontokkal. Hossza 10–11 mm. — Előfordul Közép- és Észak-Európában, hazánkban ritka. (Termőhelyei: I. Budapest, III. Trencsén (Maninhegy), IV. Bártfa, V. Brassó, VI. Bázias, VII. Ošta-rije. (*cinerea* Muls, *punctulata* Muls) **I. fennica Payk.**

## Adatok Szilágy-megye bogár-faunájához.

Közli Dr. Zilahi Kiss Endre.

### I.

Az alább felsorolt adatok legnagyobb része saját gyűjteményem, egy részök Biró Lajosnak kezeim között levő jegyzeteiből van véve. Felsoroltam azon fajokat is, amelyek a „Magyar birodalom Állatvilágában“ a „communis“, „frequens“ stb. gyűjtő szók alatt rejtőznek, annyival inkább, mivel tapasztaltam, hogy az nem minden helyen van úgy. Igen sok faj, mely különben az ország nagy részében közönséges, egyes helyeken hiányzani látszik, vagy legálább is gyéren fordul elő.

Azon adatokat azonban, melyek „A Magyar birodalom Állatvilága“ című munkában fel vannak véve, az ismétlés kikerülése végett ezen enumeratióból kihagytam. Természetes, hogy a megye faunája ezzel korántsincs kimerítve, sőt a további gyűjtéssel tetemesen bővülni fog. A „Magyar birod. Állatvilágában“ felsoroltakkal együtt ismerünk Szilágy-megyéből 537 genusba tartozó 1373 fajt, mely összesen 2214 adattal van képviselve. Vannak adatok a következő községekből és helyekről: a zilahi járásból: Zilah, Görcsön, Meszes, Kusoly, M. Goroszló, Balla; a tasnádi járásból: Tasnád, Tasnád-Szántó, Ér-Kává, Peér, Pele, Pele-Szarvad, T. Szarvad, Szakácsi, Mojád, Orbó; a krasznai járásból: M. Patak, Kraszna, Meszes, Borzás, Valkó; a szilágysomlyói járásból: S. Somlyó, S. Ujlak, Nagyfalú; a zsidói járásból: Zsidó; szilágycsehí járásból: S. Cseh, Hadad, Boglánd. A legjobban ismert a tasnádi járás, mely a megyét a magyar alfölddel köti össze: egyes községei teljesen alföldi, és helyel-közzel kétes jellegűek. A légkevesébbé ismert a zsidói járás, honnan csak Zsidóról van egy pár sovány adatom. A Meszes hegység keleti része is ide esik s összeköti a Szamosfolyó völgyét a Zilahpatak völgyével. A Szamos a megyének legnagyobb vize s partján egyoldalon a csillampalából álló Kőd-