

kg., kátrányolaj 10 kg., olajsav 2 kg., natronlúg 0.5 kg., víz 100  
 következő két keverék: 1) Oltott mész 20 kg., szénkéneg 5 kg.,  
 kátrányolaj 10 kg., natronlúg 1 kg., víz 100 liter; 2) szénkéneg 5  
 liter. Ezeket a szereket tavaszkor kell alkalmazni. Később, mikor  
 a szőlő virágzik, jó eredményyel használták a következő keve-  
 réket: Ammoniak (22<sup>o</sup>) 13 kg., fenyőcsíra 15 kg., natronlúg 2.5  
 kg., vardit (rézecetet) 0.5 kg., víz 69 kg. Ezt a szert (készítés-  
 módja hiányzik) vízzel hígították, úgy 15<sup>o</sup>/o-os oldat állt elő, mely  
 a szőlő virágjának egyáltalában nem árt. L a b a r d e már a moly  
 pillére *Polyehrosis Eudemis botrana* Schiff.) is kiterjesztette kísér-  
 leteit, a mely Franciaországban már tetemes kárt okoz; minthogy  
 Magyarországon is elég gyakori, nincsen kizárva, hogy szőlőgaz-  
 dáink ezzel is kénytelenek lesznek megismerkedni.

## Irodalom.

**Fleischer, Dr. A.:** Berichtigungen zu meinen Bestim-  
 mungstabellen der Dyschirius-Arten. (Wiener Ent.  
 Zeitg. XXIV. 1905. p. 49—50.)

Egyebek között szerző a *Dyschirius cylindricus* Schm. Er-  
 délyben előforduló alakját, mely mintegy átmeneti alak a tőalak  
 és a turkesztáni var. *Hauseri* között, var. *traussilvanicus* név alatt  
 írja le. Ez a tőalaktól abban tér el, hogy előtora sokkal hosszabb,  
 az előtor oldalai alig kerekítettek, a szárnyfedők keskenyebbek  
 és hosszabbak és tövükön éles dudorka van.

Csiki Ernő.

**Weise, J.:** *Protorina plagiata* var. *croatica* m (Deutsche  
 Entom. Zeitsch. 1905. p. 80.)

Szerző két horvátországi Orinát kapott, melyeknek színe és  
 testalakja a var. *commutata* Suffr.-éhoz hasonló, de sokkal fino-  
 mabb skulpturájuk folytán attól eltérnek.

Csiki Ernő.