

lett s a lepke belőle csak tavaszkor kelt ki. Pedig mind a kettő kétségtelenül egy anyától származott. *Dahlström Gyula.*

Parnassius Mnemosyne L. új fajváltozatát írta le újabban Stichel H. (Berl. Ent. Zeitsch. 1906. p. 88.) *Athene* név alatt, mely a törzsalakot a var. *nubilosus*-szal köti össze. Felső szárnyának üveges szegélyében 4—5 fehéres foltocska sorával, mely kivált sötét háttér mellett jól látható, de nem oly határozottan, mint a van *nubilosuson*, melyen a foltocskák száma is nagyobb. A fajváltozat typusa Görögországból való, de előfordul Dél-Franziországban és Csehországban is Hazánkban elég gyakori s eddig a var. *nubilosus*nak tartották, melynek helyébe teendő.

A. Aigner Lajos

† **Szedlaczek István és Dählström Gyula**, e két buzgó lelkész, elhunyt 1907. jun. 16 án. illetőleg aug. 13-án. Legközelebb közöljük életrajzukat.

Irodalom.

Lampert, K., Die Grossschmetterlinge und Raupen Mitteleuropas mit besonderer Berücksichtigung der biologischen Verhältnisse. Esslingen, Schreiber. Lief. 1—9.

Az egész munka 95 színes táblán 2000 rajzot és 65 szövegközti ábrát fog tartalmazni. Az egésznek ára 27 korona, tehát aránylag elég jutányos munka lesz, mely nagy súlyt helyez a lepkék morphológiájára, fejlődésére és életmódjára s azt foglalja magában a 9 füzetre terjedő bevezetés. Ennek egyes fejezetei: A rovarok alkata. A lepke alkata: a lepke, a pete, a hernyó, a báb. A lepkék, hernyók és bábok rajzolata; a nedvesség befolyása; a hőmérséklet befolyása; alkalmazkodás (védőszín, mimikry); nemi és időszaki dimorphismus; melanismus és albinismus. A lepkék és hernyók életmódja s a bábállapotot; a hernyók életmódja: a báb. A lepkék és hernyók élettartama, a kitelelés, vándorlások. A lepkék jelentősége a természet háztartásában: haszon és kár; ellenségek és betegségek. A lepkék elterjedése és rendszertana. A lepkék nomenclaturája. A gyűjtés és kikészítés módja. Az egyes fajok leírása igen rövid s az eltérésekre ki nem terjed. Ajánlható a munka oly kezdőknek, kik a magyar nyelvet nem bírják.