

Dr. C. Fr. Roewer: Revision der Opiliones Plagiostethi (= Opiliones Palpatores). I. Teil: Familie der Phalangiidae. (Subfamilien: Gagrellini, Liobunini, Leptobunini). (Abhandlungen aus dem Gebiete, der Naturwissenschaften herausgegeben vom Naturw. Verein in Hamburg. XIX. Band, 4. Heft. 1910, p. 1—294. mit 6 Tafeln.)

Szerző az összes eddig leírt kaszáspókokat tette tanulmány tárgyává és ennek eredményeként azok revízióját, mondhatnók monografiáját, közli. Az előttünk fekvő hatalmas kötet a címbeu felölelt alcsaládokat tárgyalja. A kaszáspókok (*Opiliones*) általános jellemzése után szerző azokat két csoportra osztja, ezek az *Opiliones Plagiostethi* (a régi *Palpatores*) és *Opiliones Mecostethi* (a régi *Laniatores* és *Insiidiatores*). Az első csoportot azután két alcsoportra: *Eupagosterni* és *Apagosterni* osztja. Az *Apagosterni* alcsoportba három család (*Phalangidae*, *Sclerosomidae*, *Ischyropsalidae*) tartozik, melyek közül ez a kötet a *Phalangidae* családdal, illetőleg annak három alcsaládjával foglalkozik. A *Phalangidae* családot szerző öt alcsaládra osztja: 1. *Gagrellini*, 2. *Liobunini*, 3. *Leptobunini*, 4. *Phalangini*, 5. *Oligolophini*. A tárgyaltak közül a *Gagrellini* és *Leptobunini*-k hazánkban nem fordulnak elő, a *Liobunini*-ket pedig két nem képviseli (*Liobunum*, *Nelima*). A *Liobunum rotundatum* Latr. és *L. rupestre* Hbst. fajokon kívül, melyek faunakatalogusunk szerint faunánkból már ismeretesek voltak, szerző még említi a *L. limbatum* L. Koch fajt is, mely az Alpokon kívül Erdélyben is előfordul, ez a faj tehát faunánkra új. A *Liobunum*-fajok egy részére szerző az új *Nelima* nemet állítja fel, a hová a faunánkból ismeretes *Liobunum glabrum* L. Koch-on kívül, a minket közelebb-ről érdeklő fajok közül a következők tartoznak, miután faunánkra újak: *Nelima nigripalpis* Sim. Franciaországon kívül nálunk is előfordul Brassó vidékén, *N. troglodytes* Roew. (n. sp.) a Dél-Hercegovinai barlangokból (Eliashöhle, Wolfshöhle), *N. aurantiaca* Sim. (*signatum* Kulcz.) Francia- és Bajorországon kívül Boszniában (elterjedt) és Hercegovinában (Semmeringszoros) is előfordul. Szerző alapos munkája befejezése után a kaszáspókok érdekes csoportjának sok hívet fog szerezni.

CsIKI,

*

A. Raffray: Revision des Euplectus paléaretiques (Addenda). (Bull. Soc. Ent. France. 1910, p. 365).

Szerző kimutatja, hogy a Reitter által újabban leírt *Euplectus ornatifrons* (lásd: Rovart. Lapok. XVII, 1910, p. 125) a típusok összehasonlítása alapján azonos az *E. carpathicus* Reitt.-rel.

CsIKI.

*