

Adatok Simontornya pókfaunájához.

Irita : PILICH FERENCZ.

KULCZYNSKI LÁSZLÓ krakkói tanár úr szíves volt az 1910. év folyamán általam gyűjtött és rendelkezésére bocsátott pókok rendszeres lajstromát nekem beküldeni, melyet „A Magyar Birodalom Állatvilágá”-ban felsorolt 9 fajjal és a szükséges jegyzetekkel kiegészítve ez alkalommal közrebocsátani óhajtok.

Az alábbiakban használt rövidítések magyarázatául szolgáljon, hogy római szám a gyűjtés hónapját és arabs szám annak napját jelenti, egy utána tett f pedig azt jelenti, hogy fiatal példánynyal van dolgunk. A faunakatalogusból átvett adatokat M betűvel jelöltem meg. További rövidítések: ♂ = kifejlett hím, ♀ = kifejlett nőstény; ae = junius vagy julius és au = augusztus vagy szeptemberben gyűjtve.

Uloboridae. *Uloborus Walckenaëri* LATR. (M.)

Dictynidae. *Ciniflo ferox* WALCK. (II. ♀ ; ae f), *Schineri* L. (II. f) — *Dictyna variabilis* C. L. KOCH. (II. f), *viridissima* WALCK. (au ♂ ♀).

Drassidae. *Drassodes lapidicola* W.K. (II. f) — *Prosthesima pedestris* C. L. KOCH. (au f), *electa* C. L. KOCH (II. ♀) — *Aphantaulax Albini* L. KOCH (M.)

Pholcidae. *Pholcus opilionoides* SCHR. (VIII. ♀.)

Theridiidae. *Theridium lineatum* CLERK. (IV. f ; ae f), *varians* HAHN. (II. f ; au f), *denticulatum* WALCK. (II. f ; au f), *tepidarium* C. L. KOCH. (ae ♀) — *Teutana castanea* CLERK. (ae + au ♀ ; IV. f), *triangulosa* WALCK. (ae ♂ ♀) — *Asagena phalerata* PANZ. VIII. f) — *Enoplognatha thoracica* HAHN.

Argiopidae. *Diplocephalus humilis* BLACKW. (VIII + au. ♀) — *Dicymbium nigrum* BLACKW. (II. + IV. ♀ ; au ♂ ♀) — *Stylothorax apicatus* BLACKW. (au ♂ ♀), *fusca* BLACKW. (VIII. + au ♀) — *Trachygynatha dentata* WID. (VIII. ♀ ; au ♂) — *Gongylidiellum murcidum* E. SIM. (VIII. ♂) — *Erigone atra* BLACKW. (VIII. + au ♀), *spinosa* CAMBR. (*vagans* SIM.) (VIII. ♂ ♀ ; au ♂), *dentipalpis* WID. (II. VIII. au ♂ ♀) — *Donacochara speciosa* THORELL. (M.) — *Centromerus sylvaticus* BLACKW. (au ♂ ♀) — *Sintula aërius* O. P. CAMBR. (VIII. ♂) — *Micyphantes rurestris* L. KOCH. (II. + VIII. ♀) — *Bathyphantes concolor* WID. (II. IV. VIII. au ♂ ♀), *approximatus* O. P. CAMBR. (IV. ♂) — *Lephthyphantes leprosus* OHLERT (ae ♀), *tenuis* BLACKW. (II. ♀ ; au ♂ ♀) — *Linyphia clathrata* SUND. (II. + au f) — *Stemonyphantes bucculentus* CLERK. (II. ♂ ♀) — *Pachygnatha Clerkii* SUND. (II.

♀ ; VIII. f ; au ♀), Degeerii SUND. (II. VIII. au ♀) — *Tetragnatha extensa* L. (ae f), *Solandrii* Sc. (IV. + VIII. f) — *Mangora acalypha* WALCK. (IV.) — *Araneus dromedarius* WALCK. (II. f), foliun SCHRANCK (IV. f), *diadematus* CLERCK. (ae f; VIII. ♀), *alsine* WALCK. (M.), *cucurbitinus* CLERCK. (IV. f), *umbomaticus* CLERCK. (VIII. ♀), *ixobolus* THOR. (VIII. ♂; au. ♀), (*Singa*) *nutidulus* C. L. KOCH. (II. + IV. f).

Thomisidae. *Pistius truncatus* PALLAS. (au. f). — *Misumena vatia* CLERCK. (II. f; ae ♂), *tricuspidata* FABR. (II. + IV. ♂; VIII. f) — *Oxyptila trux* BLACKW. (ae ♂), *seabrieula* WESTR. (II. ♀; au ♂), *praticola* C. L. KOCH. (IV. f) — *Xysticus cristatus* CLERCK. (IV. ♂ f), *lateralis* HAHN. (au f), *ulmi* HAHN. (IV. ♀; VIII. + au. f), *striatipes* L. KOCH. (ae f) — *Philodromus dispar* WALCK. (au. f), *poeceilus* THOR. (VII. VIII. au f), *aureolus* CLERCK. (*sensu latiore*) (IV. + au f).

Clubionidae. *Micrommata virescens* CLERCK. (IV. f) — *Clubiona phragmitis* C. L. KOCH. (IV. VIII. ♂; au ♀), *lutescens* WESTR. (II. ♀), *similis* L. KOCH. (II. ♂ ♀), *pallidula* CL. (ae ♀), *subtilis* L. KOCH. (au ♂ ♀). — *Zora spinimana* SUND. (au f). — *Micaria pulicaria* SUND. (au ♂).

Agelenidae. *Argyroneta aquatica* CL. (VIII. ♀; au ♂ f). — *Tegenaria Derhamii* SCOP. (IV. f; ae ♀; au f). — *Antistea elegans* BL. (au ♀).

Pisauridae. *Pisaura mirabilis* CL. (II. IV. f; ae ♀; au f).

Lycosidae. *Lycosa proxima* C. L. KOCH. (VIII. ♀), *amentata* CLERCK. (IV. ♂ ♀) — *Tarentula trabalis* CLERCK. (M.) *ruricola* DEG. (II. VIII. ♀; au f), *leopardus* SUND. (IV. + au f; VIII. ♂ f), *hygrophila* THOR. (VIII. ♀), *piratica* CLERCK. (VIII. ♀; au f), *latitans* BLACKW. (VIII. ♀; au f).

Oxyopidae. *Oxyopes ramosus* PANZ. (M.)

Attidae. *Synageles venator* LUC. (IV. ♂). — *Heliophanus cupreus* WALCK. (ae ♀), *auratus* C. L. KOCH. (au f). — *Salticus zebraneus* C. L. KOCH. (ae ♀) — *Marpissa radiata* GRUBE. (au ♂; M.) — *Philaeus chrysops* var. *bilineata* WALCK. (M.) — *Sitticus pubescens* F. (IV. ♀; ae ♂ ♀) — *Euophrys aequipes* O. P. CAMBR. (M.) — *Ballus depressus* WALCK. (II. f.)

Különfélék.

Utillevél Kis-Ázsiából. — Angora, 1911 április 8-án. — Régi igazság az, hogy az idő rendszerint akkor szokott a legkellemetlenebb lenni, mikor a legszébb időre volna szükség. Ezt az igazságot fájdalmasan tapasztaltam, a mikor az anatoliai vasutról vetettem az