

Ez a faj úgy látszik a *Grypathous Sénaci* Buyss.-nal rokon; de attól eltér színeződése, erőteljesebb testalkata, az előtor hátának és a szárnyfedők alakja által stb. *Gr. picipennis* RERTT.-től is könnyen megkülönböztethető.

## Különfélék.

*Az Ellicrinia trinotata* Metz. újabb termőhelye. — Ennek a hazánk faunájára új (Rovartani Lapok. XVIII, 1911, p. 93) és egyszerűségében is szép lepkefajnak valódi hazája Ázsia nyugati és a Balkán keleti része. Úgy látszik azonban, hogy ez a faj nálunk is kezd tért foglalni, a mennyiben az Alföldön, Szarvason, két egymásután következő évben fogtam. Ebből továbbá arra is lehet következtetni, hogy a második évben talált példány az előbbi évieknek ivadéka s hogy meghonosodására nálunk is kedvezőek a feltételek. Jegyzeteim szerint 1910-ben május 10, 15 és 27-én összesen négy példányt, 1911. évi május 11-én pedig egy példányt fogtam kerítésen és eresz alatt ajtófélfán vagy ablakfán ülve. Nyári alakját (*aestiva* RBL.) eddig nem találtam.

KÜRTÖSI JÓZSEF.

*Apion gracilipes*-ről. — DR. KAUFMANN ERNŐ a „Rovartani Lapok“ f. évi első számának 5. lapján foglalkozik ezzel a fajjal, amelyről azt hiszi, hogy csak az *Apion flavipes* fajváltozata. Ugyanezt a nézetet vallotta KRAATZ is (Berl. Ent. Zeitschr. 1857, p. 178), míg SCHILSKY (Käf. Europa's. 38, 1901, p. 79 a) és legújabban az Apionidák kiváló spezialistája WAGNER (Deutsche Entom. National-Bibliothek. II, 1911, p. 96) is annak faji önállóságát bizonyítja. WAGNER idézett helyen ennek az állatnak részletes leírását adja s kimutatja, hogy a hímvesző alkatát illetőleg olyan nagy különbség van a két faj között, hogy azok összetartozandósága teljesen kizárt. Ugyanezt bizonyítják a tenyésztési kísérletek is. Az *Apion gracile* csak *Trifolium medium*-on él, míg az *A. flavipes* nem válogatja a lóherefajtát. Svájcban az *A. gracilipes* közönséges, de ismeri WAGNER még Bajorországból, Oroszországból, Stájerországból és Magyarországból (Újpest, Bakony, Brassó) is. WAGNER megjegyzi, hogy KAUFMANN példánya valószínűleg egy *Apion nigrifarse* lesz, melynél a csáp sárga, csak a bunkó fekete vagy szurokbarna. Az *A. flavipes* ostorízei már a 3. íztől kezdve fokozatosan sötétebbek lesznek, csak egynéhány korzikai példánynál észlelte, hogy csak a csápbunkónak a csúcs felé eső fele sötétebb. Végül kívánatosnak tartaná WAGNER, ha KAUFMANN *Trifolium medium*-on keresné az *A. gracilipes*-t és azután közölné megfigyeléseit.

CSIKI ERNŐ.