

egyenetlen. Hossza 5—7·5 mm. — Előfordul Európában, nálunk a hegyvidék lakója és a Kárpátok területén közönséges. (*punctata* PONZA, *quadriimpressa* MOTSCH.)

26. *quadripunctata* LINN.

— Az állat erősen bronzfényű fekete, az előtor hátán levő gödröcskék sekélyek, oldalai kerekítettek. A szárnyfedők erőteljesen pontozottak, a pontok szabályos sorokat képeznek. Hossza 4 mm. — Előfordul Közép-Európában és a Kaukázusban; Magyarországon (Bártfa, Herkulesfürdő) ritka.

27. *Goëti* CAST. & GORY.

Különfélék.

Személyi hírek. A francia kormány DR. HORVÁTH GÉZA nemzeti múzeumi osztályigazgatót, a Magyar Entomológiai Társaság elnökét, a közoktatás tisztjévé (Officier de l'Instruction publique) nevezte ki. — Az „American Entomological Society“ Washingtonban DR. HORVÁTH GÉZA múzeumi osztályigazgatót és DR. KERTÉSZ KÁLMÁN múzeumi őrt levelező tagjává választotta.

Lepkészeti megfigyelés. A *Protoparce convolvuli* nálunk repülő őszi nemzedékének nőtényei tapasztalás szerint fejletlen petékkal bírnak. Az idén augusztus 25.-e körül újra fogtam egy *Pr. convolvuli* nőtényt, melyet, egyik német szaklapban olvasottak alapján, három héten át egy fabódében, meleg helyen tartottam s naponkint etettem cukoroldattal. A harmadik hét vége felé a lepkét felbontottam s benne nagyszámú teljesen fejlett petét találtam. Ha a lepkében a fogáskor mint rendszeren fejletlenek voltak a peték, úgy azok ezen idő alatt a fogságban fejlődtek ki. Elegendő táplálék és kellő hőmérséklet mellett tehát a *Protoparce convolvuli* petéi a nőtény testében épúgy fejlődnek tovább mint az áttelelő nappali lepkék petéi.

BLUMENTHAL MIKLÓS (Zombor).

Irodalom.

Lejtényi Sándor: Rovargyűjtő segédkönyv a középiskolai tanuló ifjúság számára. Második javított és bővített kiadás. Franklin-Társulat kiadása Budapest. 1911. Ára 1 K 20 f.

Szerző a 118 oldalas kis nyolezadrét alakú könyvben hasznos útmutatást ad a tanulóknak a rovarok gyűjtési módjáról és azoknak tudományos elrendezéséről. Így könyve két főrésze oszlik: az I. részben csak a gyűjtésről, a II. részben pedig a gyűjtemény elren-

dezéséről beszél egyszerű, keresetlen szavakkal. A fejezetek megírásánál szerző felhasználta az újabb irodalmat, így különösen a Rovartani Lapok erre vonatkozó cikkeit. A különféle rovarformák megismertetésére 16 oldalon bemutatja a főbb formákat képben is. Tekintve a könyv célját — hogy a tanuló ifjúság különös előszeretettel a rovarok iránt tudományos útra terelje és így hasznosítsa — a természetkutatás terén nagy szolgálatot van hivatva teljesíteni. A munkát az érdeklődők, különösen pedig a középiskolai tanárok szíves figyelmébe ajánljuk.

— I.

Karl Holdhaus, Ein neuer *Trechus* aus Dalmatien. (Entom. Blätter. VII, 1911, p. 165).

HOFFMANN ADOLF bécsi bogarász f. évi június 11-én a dalmáciai Biokovo planina-n, 1200 méter magasságban egy új *Trechus*-t gyűjtött, melyet szerző *Tr. biokovens*is név alatt ír le. Az új faj a boszniai *Tr. Brandisi*-vel rokon.

CSIKI.

Edm. Reitter, Zwei neue Grotten-silphiden aus Bosnien. (Entom. Blätter. VII, 1911, p. 173—174).

A boszniai Joharina hegyláncz egyik barlangjában WEIRATHER örsvezető két új vak Silphidát fedezett fel, melyeket szerző cikkében *Antroherpon Charon* és *Charonites Weiratheri* név alatt ír le.

CSIKI.

Edm. Reitter, Uebersicht der Arten der blinden Silphiden-gattung *Charonites* Apfelb. (Entom. Blätt. VII, 1911, p. 174—175).

Szerző három *Charonites*-faj meghatározására szolgáló kulcsot állít össze. Eddig csak egy *Charonites*-t ismertünk, a *Ch. Matzenaueri* APFB.-t, melyhez az előbb ismertetett cikkben leírt *Ch. Weiratheri* REITT. és egy új faj, a *Ch. exilis* járul, mely utóbbi a Sarajevo közelében, Han Josip mellett fekvő barlangból való.

CSIKI.

Eduard Scheeser, *Pidonia lurida* F. ♂ und *Gaurotes virginea* L. ♀ (Entom. Blätter. VII, 1911, p. 180—181).

SCHESER EDE brassói bogarász beszámol azon megfigyeléséről, hogy Borszék közelében, egy nedves réten, az útifű virágzatán a *Pidonia lurida* hímjét találta egy *Gaurotes virginea* nőstényen ülni. Minthogy előrelátható volt, hogy ezek a bogarak párosodni fognak, nem zavarta azokat meg. Két óra múlva visszatérvén ugyanarra a helyre, a párt már tényleg copulában találta, mire borszeszes üvegbe helyezte, melyben azonban rövid idő múlva széjjel mentek.

*